CARPROCOX 100

FARBIO PHARMA

Antiinflamatorio no esteroidal
Comprimidos

COMPOSICIÓN: Cada comprimido contiene:
Carprofeno .....100 mg
Excipientes c.s.p.....1 comprimido

DOSIFICACIÓN DE CARPROCOX 100:

CANINO: 4.4 mg/kg por día, oral; puede ser dada en 1 toma o dividida en 2 tomas diarias (Cada 12 horas).		
ESPECIES	**PESO (kg)**	**DOSIS**
CANINOS	12	1/2 comprimido cada 24 horas
	24	1 comprimido cada 24 h
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.		

INDICACIONES: CARPROCOX 100 es un antiinflamatorio no esteroide (AINE), destinado para caninos, el cual es un inhibidor selectivo de la COX2, que se utiliza para tratar el dolor y la inflamación postoperatoria del sistema músculo-esquelético y tejidos blandos, se recomienda adicionalmente para el dolor e inflamación aguda o crónica de las articulaciones, actúa el producto también como un antipirético.

ESPECIE: Caninos.

ADVERTENCIAS:
- Usar con cautela en caninos gerontes o en aquellos con enfermedades crónicas preexistentes (por ejemplo, enfermedad intestinal inflamatoria, insuficiencia hepática o renal).
- Puede disminuir la depuración de la creatinina, pudiendo afectar la excreción de los anestésicos por vía renal.
- No administrar a perros que tengan hipersensibilidad al carprofeno o a otro derivado del ácido propiónico.
- El uso en caninos menores a 6 semanas de edad puede implicar un riesgo.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a una temperatura entre 15-30 ºC.

TIPO DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

CONTRAINDICACIONES: No usar en caninos con trastornos hemorrágicos (por ejemplo, enfermedad de von Waillebrand). No usar en caninos con trastornos gastrointestinales. Evite su uso en animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos, dado que existe el riesgo potencial de un aumento en la toxicidad renal. No administrar a perros con úlceras gastrointestinales. El tiempo de eliminación del carprofeno en felinos es mayor que en el canino, en ausencia de datos específicos y estudios concretos, el carprofeno en felinos está contraindicado.
Uso durante la gestación y lactancia: No se ha establecido el empleo seguro del carprofeno en perros menores de 6 semanas de edad, perras gestantes, perras destinadas a reproducción o en perras lactantes. Si bien no se han observado efectos teratogénicos, se ha reportado retardo en el parto con aumento en el número de productos muertos al nacimiento.
Interacciones con otros medicamentos: Se debe evitar o administrar bajo supervisión estricta en pacientes que reciben otras medicaciones ulcerogénicas (por ejemplo, glucocorticoides u otros AINE). Las siguientes interacciones medicamentosas han sido documentadas o son teóricamente posibles en las personas o en los animales que están recibiendo carprofeno, y pueden ser importantes en los pacientes veterinarios.
Aspirina: Cuando se emplea aspirina en forma concurrente con el carprofeno, los niveles plasmáticos de éste podrían disminuir y es posible que aumenten los efectos adversos gastrointestinales (pérdida de sangre). La administración concomitante de aspirina y carprofeno no se recomienda.
Corticosteroides: La administración concomitante con AINE puede aumentar significativamente el riesgo de efectos adversos gastrointestinales.
Digoxina: El carprofeno puede aumentar los niveles séricos de digoxina; usar con cautela en pacientes con insuficiencia cardíaca grave.
Furosemida: El carprofeno puede reducir los efectos saluréticos y diuréticos de la furosemida.
Metotrexato: Ha ocurrido una toxicidad significativa cuando se ha usado AINE en forma concomitante con metotrexato; usarlos juntos con mucho cuidado.
Agentes inductores de las enzimas hepáticas (Fenobarbital, Rifampicina): Como la hepatotoxicidad del carprofeno puede ser mediada por sus metabolitos hepáticos, se debe evitar el uso de estas drogas cuando se necesita la administración de carprofeno.
Probenecida: Puede causar un aumento significativo de los niveles séricos y de la vida media del carprofeno.

PRESENTACIÓN:
Caja x 12 comprimidos

REGISTRO: 12B2-15079-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.
Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha
Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag
Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021
SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246
www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador