

CARPROVET



Analgésico, antiinflamatorio antipirético
Tabletas



COMPOSICIÓN: Cada tableta de 2 gramos contiene:

Carprofeno..... 100 mg
Excipientes c.s.p..... 2 g

INDICACIONES: Sus propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas, hacen de este AINE el tratamiento ideal para el manejo y alivio del dolor, generado por procedimientos quirúrgicos y sucesos traumáticos en caninos.

Su posible especificidad inhibitoria sobre la ciclooxigenasa-2 (COX 2), la fosfolipasa A2 y la síntesis de prostaglandinas, permiten su administración por largos periodos, sin los consecuentes efectos secundarios de otros antiinflamatorios no esteroideos; dicho efecto, facilita el control del dolor crónico, asociado a la enfermedad articular degenerativa (osteoartritis), la displasia de cadera o de codo y la enfermedad del disco intervertebral, entre otras.

USO VETERINARIO.

DOSIS:			
PESO CORPORAL	DOSIS PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS PRODUCTO	INTERVALO ENTRE DOSIS
6 kg	2 mg/kg	1/8 tableta	12 horas
12 kg		1/4 tableta	
25 kg		1/2 tableta	
6 kg	4 mg/kg	1/4 tableta	24 horas
12 kg		1/2 tableta	
25 kg		1 tableta	

Administrar por 5 a 7 días o a criterio del Médico Veterinario.

ADMINISTRACIÓN: Vía oral, directamente en la boca el animal.

ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES:

- Contraindicado en pacientes con trastornos hematológicos (anemia hemolítica), deshidratación, hipovolemia, hipotensión, hembras gestantes, cachorros menores de 6 semanas, hipersensibilidad al fármaco.
- Usar con precaución en animales gerontes y en aquellos que presenten afecciones crónicas preexistentes como: Enfermedad intestinal inflamatoria, insuficiencia renal o hepática.
- Su administración puede generar desde efectos digestivos leves, hasta daño hepático, renal o hematológico.
- De presentarse signos gastrointestinales, suspender la terapia si esto persiste por más de 1 a 2 días.
- Dosis superiores a las recomendadas, puede provocar hipoalbuminemia y melena.
- Evite su administración junto a productos que irriten el tubo gastrointestinal o con glucocorticoides, aminoglucósidos u otros AINES.
- Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura entre 15 °C y 30 °C, protegido de la luz.
- Venta bajo prescripción Médico Veterinaria.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

PRESENTACIONES:

Frasco x 50 tabletas.
Caja x 3 blister de 3 tabletas c/u.

REGISTRO: Ecuador Reg. No. Ecuador Reg. No. RIP-FAR-137

ELABORADO POR: JAMES BROWN PHARMA

Av. Interoceánica (E28C) Km. 23.5, Sector El Rosal, Barrio La Libertad, Pifo. Quito – Ecuador - PBX: (593-2) 399-7000 - www.jamesbrownpharma.com