

CEFASPUR



Antibiótico de amplio espectro
Suspensión inyectable



COMPOSICIÓN: Ceftiofur clorhidrato, Cefalosporina de tercera generación, sin tiempo de retiro en leche.

COMPOSICIÓN: Cada ml contiene:

Ceftiofur clorhidrato 50 mg
Excipientes c.s.p..... 1 ml

INDICACIONES: Para el control y tratamiento de enfermedades ocasionadas por bacterias Gram positivas y Gram negativas, causantes de la Pasteurelisis, Salmonelosis, Colibacilosis, Pododermatitis, Pleuroneumonías y enfermedades respiratorias en porcinos, bovinos, inclusive vacas en producción láctea, equinos y caninos. Adyuvante en casos de Mastitis y Metritis.

DOSIS:

Bovinos: 1-2 ml/50 kg de peso.

Equinos: 2-4 ml/50 kg de peso.

Porcinos: 1 ml/15 - 17 kg de peso.

Caninos: 0.25 ml/5 kg de peso, únicamente vía subcutánea.

Repetir cada 24 horas durante 3 a 5 días.

APLICACIÓN: Vía intramuscular profunda.

Uso veterinario.

ADVERTENCIAS:

- Agite el producto antes de su aplicación.
- Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.
- Evite el congelamiento.
- Abierto el frasco no guarde más de 15 días.
- En caso de producirse reacciones alérgicas, aplique antihistamínico o epinefrina.
- Tiempo de retiro: Carne: 2 días. Leche: no deja residuo.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Venta con prescripción Médico Veterinaria.
- Los envases eliminar en lugares autorizados.

PRESENTACIONES:

Frasco x 20 ml.

Frasco x 100 ml.

REGISTRO:

Ecuador Reg. No. 2C1-8699-AGROCALIDAD

Panamá: RF-5382-10

Perú Reg. SENASA No. F.83.42.I.0036

Bolivia Reg. SENASAG PUV-F No. 005042/12

Guatemala MAGA No. EC432-07-01-3032

ELABORADO POR: JAMES BROWN PHARMA

Av. Interoceánica (E28C) Km. 23.5, Sector El Rosal, Barrio

La Libertad, Pífo. Quito – Ecuador - PBX: (593-2) 399-7000 -

www.jamesbrownpharma.com