

## CEFTIOFUR FARBIOVET



**Antibiótico de amplio espectro**  
Solución inyectable



**COMPOSICIÓN:** Cada 1 ml contiene:

Ceftiofur HCl .....	50 mg
Vehículo c.s.p .....	1 ml

**INDICACIONES:** Antibiótico cefalosporínico de amplio espectro está indicado en el tratamiento de infecciones causadas por Gram+ y Gram negativas, inclusive en cepas productoras de betalactamasas. Para uso en bovinos, porcinos, ovinos y caninos, para tratar infecciones respiratorias, urogenitales, de piel, tejidos blandos y mastitis.

**DOSIS CEFTIOFUR FARBIOVET:**

Dosis de referencia: 1,1-2,2 mg/ kg/día.		
ESPECIE	PESO ( kg)	DOSIS ( ml)
BOVINOS	50	1,1-2,2 ml
OVINOS	50	1 ml
Dosis de referencia: 3-5 mg/ kg/día.		
PORCINOS	20	1,2-2 ml
Dosis de referencia: 2.2 mg/ kg/día		
CANINOS	5	0,2 ml

Duración del tratamiento de 3 a 5 días según el criterio del Médico Veterinario.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Intramuscular profunda.

**PREPARACIÓN:** Ninguna. Producto listo para su aplicación.

**CONTRAINDICACIONES:** No se debe utilizar en animales con hipersensibilidad o alergia sabida a la droga o que sean sensibles a beta-lactámicos (por ejemplo. Penicilinas, cefamicinas, carbapenemas).

En los porcinos, las áreas de coloración asociadas con los sitios de inyección en lapso de 11 días o menos pueden llevar al descarte de tejido comestible durante la faena.

En los bovinos después de administrar IM en el cuello, las áreas de coloración en el sitio que persiste más allá de 11 días pueden producir el descarte del tejido comestible durante la faena. Después de la administración IM en los miembros posteriores, las áreas de coloración en el sitio de inyección persisten más de 28 días producirán descarte de tejido comestible durante la faena.

**USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA:** No se han determinado los efectos del Ceftiofur sobre el rendimiento reproductivo, la preñez y la lactancia. Las cefalosporinas son relativamente seguras para ser usadas en la gestación.

**ADVERTENCIAS:** Las cefalosporinas pueden producir anemia y trombocitopenia que es reversible al terminar el tratamiento puede provocar en el sitio de administración áreas muertas con decoloración.

No administrar en hembras gestantes.

Los pacientes con insuficiencia renal necesitan que se ajuste la dosis.

**REACCIONES ADVERSAS:** Los efectos adversos de las cefalosporinas no suelen ser serios y son de frecuencia muy baja.

Las reacciones de hipersensibilidad pueden ocurrir con erupción cutánea, fiebre, eosinofilia, linfadenopatía o anafilaxis completa.

**INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN:** Las cefalosporinas podrían inducir nefrotoxicidad aditiva cuando se utiliza con aminoglucósidos.

**TIEMPO DE RETIRO:** Carne 48 horas.

**ALMACENAMIENTO:** Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C a 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

**DECLARACIÓN DE VENTA:** Con prescripción Médico Veterinaria.

**PRESENTACIONES:**

Frasco x 20 ml.

Frasco x 50 ml.

Frasco x 100 ml.

**REGISTRO:** 2C1-14031-AGROCALIDAD.

**ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR:** FARBIOPHARMA S.A.

**Dirección:** Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador