CEFTIOFUR®

Cefalosporina de tercera generación
Vía intramuscular

COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Ceftiofur ..... 5 g
Excipiente c.s.p. ..... 100 ml

INDICACIONES: Es una cefalosporina de tercera generación, antibiótico bactericida de amplio espectro contra bacterias Gram-negativas y Gram-positivas.
Sus principales usos clínicos son:
En enfermedades como: Pasteurelosis, neumonías, bronconeumonías, septicemia, necrobacilosis, gabarro, pododermitis, mastitis, metritis, querato, conjuntivitis, leptospirosis, salmonelosis, clostridiasis, enfermedades del aparato urinario.

ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, equinos, caninos.

DOSIS:

APLICACIÓN INTRAMUSCULAR PROFUNDA.
Bovinos: 1-2 mg/kg; 1-2 ml/50 kg.
Ovinos y caprinos: 1.1-2.1 mg/kg;1-2 ml/45.5 kg.
Porcinos: 1-3 mg/kg; 1-3 ml/50 kg.
Equinos: 2.2-4-4 mg/kg; 1-2 ml/23 kg.
Caninos y felinos: 2 mg/kg; (vía subcutánea).
Repetir la dosis cada 24 horas por 3 a 5 días.

ASPECTOS TOXICOLÓGICOS:
Administrar a especies y dosis recomendadas.
No administrar a animales sensibles a las cefalosporinas, ni en infecciones resistentes a las mismas.
En animales con problemas renales y hepáticos.

TIEMPO DE RETIRO: No usar este producto 48 horas antes del sacrificio en animales destinados a consumo humano. En vacas lecheras el período de retiro es cero días.

ALMACENAMIENTO:
Humedad Relativa: 40 – 70 %.
Mantener en un lugar fresco y protegido de la luz entre 8º y 25° C.

RECOMENDACIONES:
- Agite el producto antes de aplicar.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Venta bajo prescripción del Médico Veterinario.

PRESENTACIONES:
Frasco x 10 ml.
Frasco x 100 ml.
Frasco x 500 ml.

REGISTRO: 2C1-14349-AGROCALIDAD.

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: INDUFAR ECUADOR.