

CELOSTOP



Progestágeno sintético
Solución inyectable



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Medroxiprogesterona acetato.....5 g
Vehículo c.s.p.....100 ml

INDICACIONES: Es un progestágeno sintético, que suprime el estro en caninos y felinos hembras que se encuentran en anestro. (Idealmente de 20 a 30 días menos a la incidencia del pro-estro). Evitando el celo y con esto la preñez. Indicado en caninos y felinos hembras.

DOSIFICACIÓN DE CELOSTOP:

CANINOS FELINOS	Dosis referencial: 2-3 mg/kg de peso.
	Dosis CELOSTOP: 0.2-0.3 ml de CELOSTOP por cada 5 kg de peso vivo.
Administrar en la segunda mitad del anestro.	
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO: Cada 6 meses para lograr el cese completo del celo.	
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea.	

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea. Cada 6 meses para lograr el cese completo del celo.

CONTRAINDICACIONES:

- Animales que no están en anestro.
- Animales que no han alcanzado la madurez sexual.
- Sospecha de trastornos uterinos.
- Malformaciones genitales.
- Hembras preñadas (por el riesgo de producir gestación prolongada y muerte fetal).

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA:

El uso durante la gestación está contraindicado.

ADVERTENCIAS: No se recomienda en otra especie que no sea la autorizada

REACCIONES ADVERSAS: La sobredosis o tratamiento prolongado puede ocasionar hiperplasia endometrial quística piómetra y tumores mamarios, aumento de apetito y peso, reducción de la espermatogénesis, letargia, cambios de temperamento, inquietud, problemas cutáneos y cambios en la piel y el pelo (alopecia, cambio de color en pelaje y piel) se recomienda aplicar la dosis en el área inguinal para que no sea tan evidente la lesión.

Potencialmente todos los progestágenos pueden inducir la producción de hormonas del crecimiento, y una sobreproducción crónica de este tipo de hormonas pueden causar síntomas clínicos de acromegalia y antagonismo a la insulina periférica, que puede producir diabetes mellitus.

La terapia con progestágenos también puede causar supresión adrenocortical.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN:

La aminoglutetimida puede disminuir los efectos de la medroxiprogesterona.

El felbamato puede aumentar el metabolismo de la medroxiprogesterona.

Existe una posible interacción con la rifampina, lo que puede disminuir la actividad progestágena si se administra en forma conjunta. Se presume que esto se debe a la inducción de enzimas microsomales con el resultante aumento del metabolismo de los

progestágenos.

SOBREDOSIFICACIÓN (SÍNTOMAS, MEDIDAS DE URGENCIA, ANTÍDOTOS): Puede aparecer náuseas, vómitos y posiblemente un episodio de sangrado. Se han descrito efectos de sedantes centrales con progestágenos administrados en altas dosis. El tratamiento es sintomático.

TIEMPO DE RETIRO: Ninguno.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura no mayor de 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

Jeringa prellenada x 1 ml
Frasco x 1 ml
Frasco x 5 ml

REGISTRO: 9B2-2-13078-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador