

## CERDOBAC



**Bacterina porcina**  
Suspensión inyectable



**FÓRMULA:** Cada 100 ml contiene:

<i>Pasteurella multocida</i> A (I, II, III).....	25 %
<i>Pasteurella haemolytica</i> .....	15 %
<i>Escherichia coli</i> .....	15 %
<i>Salmonella typhimurium</i> .....	15 %
<i>Salmonella choleraesuis</i> .....	15 %
Vehículo c.s.p. ....	100 ml

**ESPECIES:** Porcinos.

**DOSIS DE CERDOBAC:**

ESPECIE	DOSIS	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
<b>PORCINOS ADULTOS</b>	5 ml	Intramuscular o subcutánea.
<b>LECHONES</b>	3 ml	Intramuscular o subcutánea.
<b>VACUNACIÓN:</b> Agitar antes de usar.		

- Aplicar en lechones a los dos meses de edad, aplicar un refuerzo en cada cambio estacional o cuando se transporte a los animales.
- Se recomienda aplicar a hembras en temporada de monta y aplicar un refuerzo 21 días antes del parto.

**INDICACIONES DE USO:** CERDOBAC es una bacterina indicada para la prevención y el control de la septicemia hemorrágica, pasteurelosis, colibacilosis y salmonelosis en porcinos.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Intramuscular o Subcutánea.

**DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD:**

**Pasteurelosis:** Enfermedad bacteriana que se caracteriza por bronconeumonía y evoluciona ocasionalmente, con pericarditis y pleuritis. Los principales signos clínicos son fiebre, disnea y cianosis sin compromiso entérico, que sugieren una condición de neumonía.

**COLIBACILOSIS:** Enfermedad bacteriana que desencadena diarreas neonatales, es ocasionada por la bacteria *E. coli*, siendo el serotipo más patógeno: *E. coli* enterotoxigénico, el cual produce enterotoxinas que provocan una secreción de líquidos y electrolitos por parte de las células epiteliales del intestino (diarrea).

**SALMONELOSIS:** Infección producida por bacterias del género *Salmonella* (familia Enterobacteriaceae). La principal ruta de infección es la vía oral, tras el contacto con heces de animales infectados. En ocasiones esta infección consigue, pasar a sangre, multiplicarse en los macrófagos y por esa vía alcanzar el hígado, bazo, pulmones, provocando una infección generalizada y septicemia.

**MECANISMO DE ACCIÓN:** Estimula al sistema inmune para la producción de anticuerpos contra antígenos bacterianos específicos, previniendo la colonización de las bacterias: *Pasteurella multocida* tipo A (I, II, III), *Pasteurella haemolytica*, *Escherichia coli*, *Salmonella typhimurium*, *Salmonella choleraesuis*, evitando la presentación de pasteurelosis, colibacilosis y salmonelosis en porcinos.

**PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES:**

- No guardar sobrantes.
- No aplicar en animales enfermos.
- No congelar.

**INTERACCIONES:** No reportado.

**REACCIONES ADVERSAS:** En casos esporádicos, puede presentarse una reacción alérgica a la aplicación de la vacuna, si sucediera administrar inmediatamente epinefrina, corticoides y/o

antihistamínicos según el criterio del Médico Veterinario.

**RETIRO:** Ninguno.

**PRESENTACIONES:**

- Frasco x 25 ml
- Frasco x 50 ml

**REGISTRO:** 4C-9798-AGROCALIDAD

**ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR:** FARBIOPHARMA S.A.

**Dirección:** Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha  
Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador