

CIPROFLOXACINA FARBIOVET



Antibiótico de amplio espectro
Polvo oral



COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene:

Ciprofloxacina..... 95 g
Excipientes c.s.p..... 100 g

INDICACIONES: Aves, pollos de engorde y pavos, actúa contra enfermedades causadas por microorganismos Gram positivos, Gram negativos y Mycoplasmas susceptibles a la Ciprofloxacina. En neumonía e infecciones gastrointestinales en porcinos.

DOSIS DE CIPROFLOXACINA FARBIOVET:

Aves: Dosis de referencia 1 000 aves (5 mg Ciprofloxacina/ kg p.v)

CIPROFLOXACINA FARBIOVET	Alimento	Edad semanas	Peso promedio
0,9 g	11,8 kg	0 a 1	165 g
2,1 g	16,8 kg	1 a 2	400 g
4,73 g	23,1 kg	2 a 3	900 g
7,37 g	29,9 kg	3 a 4	1.400 g
10,5 g	35,8 kg	4 a más	2.000 g

Porcinos: Dosis de referencia 1 000 cerdos (7 mg Ciprofloxacina/ kg p.v)

CIPROFLOXACINA FARBIOVET	Alimento	Edad semanas	Peso promedio
0,7-8,7 g	22,72 kg	0 a 6	0,91-11 kg
8,7-19,7 g	68,18-90,90 kg	7 a 11	11-25 kg
19,7-43,4 g	136,36-227,27 kg	11 a 18	25-55 kg
43,4-71 g	227,27-272,72 kg	18 a más	55-90 kg

Administrar de 3 a 5 días o según criterio del Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

PREPARACIÓN: Mezclado con agua.

ADVERTENCIAS: No induce hepatotoxicidad ni daño renal, pero no se recomienda administrar a pacientes con este tipo de padecimiento.

Si se administra Ciprofloxacina junto con teofilina, aumentan los valores séricos de la teofilina. El probenecid bloquea la secreción tubular de la Ciprofloxacina. No se recomienda administrar junto con nitrofurantoina.

Ocasionalmente se pueden presentar anorexia náuseas vómitos y gastritis.

REACCIONES ADVERSAS: Con la excepción de las posibles anomalías cartilaginosas en los animales jóvenes, el perfil de efectos adversos de la ciprofloxacina suele limitarse a alteraciones gastrointestinales (vómito, anorexia).

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN:

Los productos que contienen cationes Mg^{++} , Al^{++} o Ca^{++} puede unirse a la Ciprofloxacina y evitar su absorción. Separar la administración de estos productos por, al menos, 2 horas.

El hierro, Zinc por vía oral disminuye la absorción de la Ciprofloxacina, de debe separar la administración de estos productos por un periodo no inferior a 2 horas.

TIEMPO DE RETIRO: Carne 7 días después del último tratamiento.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, pro-

tegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN:

Sobre x 1 kg.

Tambor x 25 kg.

REGISTRO: 2C-13494-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador