

CIRCUMVENT® PCV-M

Vacuna combinada contra el Circovirus Porcino, Tipo 2 y Bacterina contra *Mycoplasma hyopneumoniae*
Solución inyectable



INDICACIONES Y CONTENIDOS: Vacuna combinada lista para su uso en cerdos sanos de 3 semanas de edad o más, como ayuda en la prevención de la viremia, y la reducción de la excreción del virus causado por el circovirus porcino de tipo 2, además como ayuda en el control de la neumonía provocada por *Mycoplasma hyopneumoniae*.

VENTAJAS:

- Vacuna con la garantía de la combinación lista para usar.
- La combinación reduce el número de inyecciones en los cerdos.
- Prevención probada contra la infección crónica de PCV2 (viremia).
- Reducción comprobada de la excreción de PCV2.
- Las 2 dosis garantizan una larga duración con protección efectiva.
- No hay necesidad de usar dentro de 4 horas o descartar posteriormente.
- No hay riesgo de contaminación debido a la mezcla.
- No hay mano de obra adicional para la mezcla o administración.
- No es necesaria una segunda botella para realizar la mezcla de la vacuna.
- Protección sostenida durante todo el periodo de engorde sin el riesgo de caída de los anticuerpos.
- Permite el máximo rendimiento y menos variación en el acabado de sus cerdos.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Permitir que la vacuna alcance la temperatura ambiente (16°-27°C). Agitar bien y administrar una dosis de 2.0 ml por vía intramuscular a los cerdos sanos de 3 semanas de edad o más, seguido por una segunda dosis de 2.0 ml (revacunación) tres semanas más tarde.

PRECAUCIONES:

- Almacene refrigerado de 2° a 8°C.
- No congelar.
- Utilizar inmediatamente después de su apertura; no guarde contenidos parciales.
- Quemar el contenedor y todo el producto no usado.
- Utilizar sólo en cerdos saludables.
- No vacunar dentro de los 21 días previos al sacrificio.
- Tomar medidas preventivas para evitar inyectarse accidentalmente en los dedos, las manos, u otros partes del cuerpo.
- La inyección accidental puede causar reacciones locales graves. En caso de ocurrir póngase en contacto con un médico inmediatamente.
- Pueden presentarse reacciones locales, en el sitio de la inyección de los animales vacunados, y la mayoría de estas reacciones desaparecen en 16 a 23 de días siguientes a la vacunación.
- Algunas reacciones sistémicas pueden ser vistas después de la vacunación.
- Si se produce reacción alérgica, tratar con epinefrina.

PRESERVANTES: Gentamicina y Timerosal.

PRESENTACIONES:

Frasco x 100 ml (50 dosis)
Frasco x 500 ml (250 dosis)

REGISTRO: 4A 13119-AGROCALIDAD.

FABRICADO POR: INTERVET INC.

DISTRIBUIDO POR: IMPVET CÍA. LTDA.

Km 5,5 VÍA DAULE

Telf.: (04) 602-0410 / 09-9975-9666