

CLASS



Antibiótico, antiinflamatorio no esteroide
Polvo para reconstituir



COMPOSICIÓN: Cada frasco para reconstituir en 10 ml contiene:
 Penicilina G Benzatínica1 500 000 UI
 Penicilina G Procaínica750 000 UI
 Penicilina G Potásica.....750 000 UI
 Dihidroestreptomycinina 1 250 mg
 Diclofenaco sódico 115 mg
 Excipientes c.s.p.

Cada frasco para reconstituir en 20 ml contiene:

Penicilina G Benzatínica.....3 000 000 UI
 Penicilina G Procaínica1 500 000 UI
 Penicilina G Potásica.....1 500 000 UI
 Dihidroestreptomycinina..... 2 500 mg
 Diclofenaco sódico 230 mg

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Antibiótico, Antiinflamatorio no esteroide.

FORMA FARMACÉUTICA: Polvo para reconstituir.

INDICACIONES DE USO: CLASS es una combinación de 4 antibióticos y un antiinflamatorio no hormonal. Las Penicilinas tienen una marcada acción bactericida sobre los gérmenes Gram-positivos, mientras que la Estreptomycinina ejerce su acción sobre las bacterias Gram-negativas. El Diclofenaco es un antiinflamatorio que además de tener efectos analgésicos y antipiréticos, no es hormonal y por lo tanto se puede administrar a hembras gestantes. Es un producto de acción rápida y prolongada.

Para el control y tratamiento de enfermedades infecciosas sensibles a la penicilina y estreptomycinina, que pueden estar acompañadas de procesos inflamatorios en: Bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y caninos. CLASS es eficaz contra; Neumonía bacteriana, Carbón bacteriano y sintomático, Edema maligno, Mastitis, Adenitis, Metritis, Infecciones del ombligo (onfalitis) y de las pezuñas (panadizo), Difteria de los terneros, Pasteurellosis, Gurma equina, Erisipela porcina; adyuvante en el tratamiento de Moquillo canino y profilaxis post-quirúrgica.

DOSIS SUGERIDA: 1 ml CLASS/15 kg de peso. La suspensión es estable por 7 días cuando se almacena en el refrigerador. Se recomienda repetir la dosis después de 48 a 72 horas.

La dosis podrá ser modificada a indicación expresa del Médico Veterinario.

FORMA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular profunda. Utilizar agujas estériles calibre 16G o 18G. La dilución debe prepararse el momento que se va a utilizar, mezclando el diluyente con el polvo y agitando vigorosamente el vial hasta que la suspensión quede completamente homogénea sin presencia de espuma y no se vean depósitos en el fondo. No deje el producto preparado por un largo rato, ya que obstruye la aguja y atasca el émbolo. No inyecte más de 20 ml por punto de aplicación.

USO VETERINARIO:

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

- Mantener el envase bien cerrado.
- Conservar a temperatura ambiente (15°C a 30°C) y 70% de HR.
- Proteger de la luz solar.

ADVERTENCIAS:

- No verter el producto en afluentes como ríos o arroyos.

- No reutilizar este envase.
- No administrar por vía intravenosa.
- Los antibióticos en ciertos organismos pueden causar reacciones de hipersensibilidad, tratar de acuerdo a la sintomatología del animal.
- Los antibióticos con actividad bacteriostática, pueden interrumpir el efecto de la penicilina.
- Venta bajo receta médica.

MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

TIEMPO DE RETIRO:

Leche: 3 días.

Carne: 30 días.

PRESENTACIONES:

Frasco con polvo para reconstituir en 10 ml de diluyente.

Frasco con polvo para reconstituir en 20 ml de diluyente.

Frasco con polvo para reconstituir en 75 ml de diluyente.

Q.F.R.: Nelly López de Cobo

REGISTRO: 2C2-6386-AGROCALIDAD

REGISTRO PANAMÁ: RF-7880-16

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR: C.C. Laboratorios Pharmavital Cia Ltda, km. 7 ½ vía Quito, Ambato – Ecuador

Servicio al cliente: (593) 2 2806167 - (593) 2 2806436