

CLORTETRACICLINA FARBIOVET



Antibiótico de amplio espectro
Polvo oral



COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene:

| | |
|-----------------------|-------|
| Clortetraciclina..... | 95 g |
| Excipiente c.s.p..... | 100 g |

INDICACIONES: CLORTETRACICLINA FARBIOVET está indicado en aves para el tratamiento de la enfermedad respiratoria crónica.

Infecciones por *Escherichia coli*.

En porcinos para el tratamiento de Enteritis y neumonías causadas por *Pasteurella multocida*.

Agentes:

Principalmente contra el micoplasma y de los gérmenes Gram positivos dentro de los cuales se consideran los siguientes: *Mycoplasma gallisepticum*, *M. sinoviae*, *M. hyponeumoniae*, también presenta actividad en contra de, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Streptococcus sp.*, *Pasteurella Multocida*, *Escherichia coli*.

DOSIS DE CLORTETRACICLINA FARBIOVET:

Aves: Dosificación (Referencial 1 000 aves).

Clortetraciclina 20-40 mg/kg p.v

| CLORTETRACICLINA FARBIOVET | Cantidad de Alimento | Edades semanas | Peso promedio |
|----------------------------|----------------------|----------------|---------------|
| 7 g | 11,8 kg | 0-1 | 165 g |
| 16,8 g | 16,8 kg | 1-2 | 400 g |
| 38 g | 23,1 kg | 2-3 | 900 g |
| 59 g | 29,9 kg | 3-4 | 1.400 g |
| 84,2 g | 35,8 kg | 4 o más | 2.000 g |

Cerdos: Dosificación (Referencial 100 cerdos).

Clortetraciclina 20-40 mg/kg p.v

| CLORTETRACICLINA FARBIOVET | Cantidad de Alimento | Edades semanas | Peso promedio |
|----------------------------|----------------------|----------------|---------------|
| 38,3-46,3 g | 22,72 kg | 0-6 | 0,91- 11 kg |
| 46,3-105,3 g | 68,18 - 90,90 kg | 7-11 | 11-25 kg |
| 105,3-231,6 g | 136,36 - 227,27 kg | 11-18 | 25-55 kg |
| 231,6-378,9 g | 227,27 - 272,72 kg | 18-o más | 55-90 kg |

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. Se recomienda de 5 días consecutivos de tratamiento cada 24 horas, salvo mejor criterio del Médico Veterinario.

PREPARACIÓN: Aplicación en el alimento.

CONTRAINDICACIONES: Puede manchar los dientes de animales jóvenes y en otros provocar trastornos gastrointestinales. En aves las tetraciclinas tienen un efecto inmunosupresor si se administran de manera continua.

ADVERTENCIAS: No se debe administrar en ponedoras en producción de huevos destinados al consumo humano.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA: Las tetraciclinas son excretadas en la leche pero como gran parte de la droga estará unida al calcio lácteo, es poco probable que sea importante para las crías en lactancia.

REACCIONES ADVERSAS: Están relacionados con sus propiedades irritantes, vómitos después de la administración, capacidad de alteración de la microflora intestinal, con su capacidad para fijar el calcio, y sus efectos tóxicos sobre las células hepáticas y renales.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: Incompatible con Mg, Al, Fe y antiácidos cuya base es calcio.

No administrar con Beta-Lactámicos o Aminoglucósidos.

Las tetraciclinas pueden disminuir la actividad plasmática de la protrombina y los pacientes que están bajo un tratamiento anticoagulante (por ejemplo, con warfarina) pueden necesitar un ajuste de la dosis.

TIEMPO DE RETIRO: Carne 5 días.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN:

Sobre x 1 kg.

REGISTRO: 2C1-13435-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador