

CLORTIAMULOX



Antibiótico de amplio espectro
Polvo oral



COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene:

Clortetraciclina.....	15 g
Tiamulina con Fumarato hidrogenado.....	5 g
Excipiente c.s.p	100 g

INDICACIONES: CLORTIAMULOX, es en base a Clortetraciclina que para ampliar su espectro se ha combinado con Tiamulina está indicado:

En aves para el tratamiento de la enfermedad respiratoria crónica por *Mycoplasma gallisepticum* y de la sinovitis infecciosa por *Mycoplasma synoviae*, y del cólera aviar por *Pasteurella multocida*. Infecciones por *Escherichia coli*.

En porcinos para el tratamiento y control de rinitis atrófica, las infecciones del tracto respiratorio inferior causadas por *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *M. hyopneumoniae* y Enteritis y neumonías causadas por *Pasteurella multocida*. En el control de Micoplasmosis porcina.

DOSIS DE CLORTIAMULOX:

AVES		Dosificación (Referencia 1 000 aves)	
		Tiamulina 160 ppm-Clortetraciclina 20-40 mg/kg p.v.	
CLORTIAMULUX (g)	ALIMENTO (kg)	EDADES SEMANAS	PESO PROMEDIO
46.6 g	11.8 kg	0-1	165 g
66.4 g	16.8 kg	1-2	400 g
91.2 g	23.1 kg	2-3	900 g
118 g	29.9 kg	3-4	1 400 g
141.41 g	35.8 kg	4 o más	2 000 g
CERDOS		Dosificación (Referencia 100 cerdos)	
		Tiamulina 7 mg/kg p.v. Clortetraciclina 20-40 mg/kg p.v.	
CLORTIAMULUX (g)	ALIMENTO (kg)	EDADES SEMANAS	PESO PROMEDIO DEL CERDO
16-190 g	22.72 kg	0-6	0.91-11 kg
190-432 g	68.18-90.90 kg	7-11	11-25 kg
432-950 g	136.36-227.27 kg	11-18	25-55 kg
950-1 555 g	227.27-272.72 kg	18 o más	55-90 kg

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

PREPARACIÓN: Aplicación en el alimento.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a alguno de los principios activos de la fórmula.

ADVERTENCIAS: Está contraindicado en casos que presenten hipersensibilidad a la Tiamulina. No administrar junto a Ionóforos como salinomina, lasalocida, narasina y monensina, ya que puede generar síndrome neurológico grave.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA:

Las tetraciclinas son excretadas en la leche pero como gran parte de la droga estará unida al calcio lácteo, es poco probable que sea importante para las crías en lactancia.

No administrar cuando el animal está cerca del término de su preñez.

REACCIONES ADVERSAS: Tiene una acción erosiva en los cartílagos de crecimiento. En altas dosis puede provocar convulsiones.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: Presenta incompatibilidad con penicilinas, cefalosporinas, iones bi y trivalentes como Mg, Al, Fe y Ca.

TIEMPO DE RETIRO: Carne: 10 días Huevos: cero días.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

Sobre x 500 g.

Sobre x 1 kg.

Funda x 25 kg.

REGISTRO: 2C1-13493-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador