

COBACTAN® 2,5%


MSD

Salud Animal


IMPVET
Cefalosporina de la 4. Generación
Antibiótico inyectable

COMPOSICION: Cada ml contiene

Cefquinoma (sulfato). 25 mg

INDICACIONES: Antibiótico de amplio espectro para uso en bovinos y cerdos para el tratamiento de infecciones bacterianas causadas por microorganismos gram + y gram –, sensibles a la cefquinoma.

Como parte del grupo de la cuarta generación de la cefalosporina, el cefquinome combina la propiedad de alta penetración celular con una alta estabilidad contra las Beta-lactamasas.

Bovinos: Procesos respiratorios causados por *Pasteurella multocida* y *P. haemolytica*. Pododermatitis y necrobacilosis interdigital. Mastitis aguda causada por *E. Coli* con sintomatología sistémica. Septicemia por *E. Coli* en terneros.

Cerdos: Para el tratamiento de infecciones bacterianas en pulmón y tracto respiratorio producidas por *Pasteurella multocida*, *Haemophilus parasuis*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Streptococcus suis* y otros microorganismos sensibles a la cefquinoma. Síndrome Mastitis-Metritis-Agalaxia (MMA).

DOSIFICACIÓN:

Bovinos: 2 ml por cada 50 kg de peso vivo cada 24 horas durante 3 a 5 días. Para el tratamiento de mastitis aguda por *E.coli* 2 ml por cada 50 kg peso vivo cada 24 horas durante 2 días. En caso de septicemia por *E.coli* en terneros 4 ml por cada 50 kg de peso vivo cada 24 horas durante 3 a 5 días.

Cerdos: 2 ml por cada 25 kg de peso vivo cada 24 horas durante 3 días, en caso de MMA durante 2 días.

ADMINISTRACIÓN: Aplicación intramuscular previa agitación del frasco.

PERIODO DE RETIRO:

Bovinos:

Carne: 5 días.

Leche: 24 horas.

Cerdos:

Carne: 3 días.

PRESENTACIÓN:

Frasco x 50 ml.

REGISTRO: 2C1-8002-AGROCALIDAD.

FABRICADO POR: INTERVET GMBH, ALEMANIA

DISTRIBUIDO POR: IMPVET CÍA. LTDA.

Km 5,5 VÍA DAULE

Telf.: (04) 602-0410 / 09-9975-9666