

COBACTAN® LC


MSD

Salud Animal


IMPVET

**Antibiótico contra la Mastitis
clínica en vacas lactantes**
Aplicación intramamaria



COMPOSICIÓN: Cada inyector de 8 g contiene:

Cefquinoma 75.0 mg
(como sulfato)
Excipiente c.s.p.

INDICACIONES: Para el tratamiento de la Mastitis clínica de las vacas lactantes, causadas por los siguientes microorganismos sensibles a la cefquinoma: *Streptococcus uberis*, *Streptococcus dysgalactiae*, *S. agalactiae*, *Staphylococcus aureus* y *Escherichia coli*.

Como cefalosporina de cuarta generación, el cefquinome combina una alta penetración celular y una estabilidad alta a las betalactamasas.

DOSIFICACIÓN: Se recomienda la aplicación de una jeringa por cuarto afectado cada 12 horas, después del ordeño, hasta completar 3 aplicaciones.

- Ordeñar a fondo.
- Limpieza y desinfección del orificio del pezón antes de aplicar el producto.
- Aplicar el contenido de una jeringa en cada cuarto afectado.
- El diseño de la cánula permite la introducción parcial o total del pezón.
- Haga un masaje suave del pezón y la ubre para favorecer la dispersión del producto.

PERIODO DE RETIRO: La leche no deberá destinarse para consumo humano durante el tratamiento y hasta 96 horas después del último tratamiento.

PRESENTACIÓN:

Caja x 15 inyectores x 8 g.

REGISTRO: 2 C3-8115-AGROCALIDAD.

FABRICADO POR: INTERVET GMBH, ALEMANIA

DISTRIBUIDO POR: IMPVET CÍA. LTDA.

Km 5,5 VÍA DAULE

Telf.: (04) 602-0410 / 09-9975-9666