

COLTIVAR



Bacterina aviar
Solución inyectable



COMPOSICIÓN:

<i>Salmonella gallinarum</i>	26x10 ⁹
<i>Salmonella pullorum</i>	26x10 ⁹
<i>Pasteurella multocida</i>	490x10 ⁹

INDICACIONES: Preventivo contra el cólera aviar, tifoidea aviar y pullorosis. Es aconsejable su uso para proteger las aves contra estas enfermedades en las grandes y pequeñas explotaciones avícolas.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

Aves de 3 hasta 12 semanas: 0,5 ml.
Aves mayores de 12 semanas: 1,0 ml.
Revacunar cada 5 - 6 meses.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea, en la región de la pechuga o debajo del ala. El grado de inmunidad podrá acentuarse en la segunda dosis, siete días después de la primera.

PRECAUCIONES: Conservar en refrigeración entre 3 y 7° C. Agitar el frasco antes del uso.

PRESENTACIÓN:

Frasco x 100 ml.

REGISTRO: 4C-1827-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: LABORATORIOS LIFE ECUADOR.