

CORI-PAST



**Bacterina para prevenir la Coriza infecciosa y el cólera o
Pastereiosis aviar**



COMPOSICIÓN: Cada 0.5 ml (1 dosis) contiene:

<i>Avibacterium paragallinarum</i> , Serotipo A.....	2x10 ⁹ UFC
<i>Avibacterium paragallinarum</i> , Serotipo B.....	2x10 ⁹ UFC
<i>Avibacterium paragallinarum</i> , Serotipo C.....	2x10 ⁹ UFC
<i>Pasteurella multocida</i> , Serotipo 1.....	2x10 ⁹ UFC
<i>Pasteurella multocida</i> , Serotipo 3.....	2x10 ⁹ UFC
<i>Pasteurella multocida</i> , Serotipo 4.....	2x10 ⁹ UFC
<i>Pasteurella haemolytica</i> (<i>Gallibacterium anatis</i>) Serotipo local.....	2x10 ⁹ UFC
Excipientes c.s.p.	1 dosis

GENERALIDADES: Las enfermedades de Coriza Infecciosa, Cólera aviar y desafíos con *Pasteurella haemolytica* causan sintomatologías muy complejas, más aún cuando se combinan con agentes virales respiratorios; por esta razón, se ha diseñado **CORI-PAST** que, al aplicar en una sola vacuna, evita el estrés de las aves, mano de obra en vacunaciones.

PROPIEDADES: Los serotipos contenidos en la vacuna **CORI-PAST**, han sido seleccionados por sus características genotípicas y su capacidad esencial de estimular anticuerpos multivalentes para los serotipos contenidos.

Una cosecha seleccionada, purificada y altamente antigénica de los SEROTIPOS A, B, C y serotipos locales de *Avibacterium paragallinarum*. Además de los tres serotipos más prevalentes de la *Pasteurella multocida* y la *Pasteurella haemolytica* (*Gallibacterium anatis*) cepa local, por lo que brinda amplia cobertura.

El gel hidróxido de aluminio utilizado en la vacuna, le proporciona una alta capacidad inmunogénica y lenta adsorción, así como una dispersión homogénea del antígeno en el momento de la aplicación. Además, reduce el impacto de la reacción post-vacunal y permite una continua y duradera estimulación del sistema inmune.

INDICACIONES: Para la prevención de Coriza Infecciosa y Pastereiosis en una sola aplicación, en gallinas de postura y reproductoras.

DOSIS:

Primera dosis: Aplicar 0,5 ml a las 8 a 12 semanas de edad.

Segunda dosis: Aplicar 0,5 ml de 4 a 6 semanas de edad.

Se recomienda la revacunación de 40-45 semanas de edad en áreas de alto desafío, en aves de muda forzada y en múltiples edades.

TIEMPO DE RETIRO: No tiene.

PRECAUCIONES:

- Vacunar solo aves sanas.
- Mantenga en refrigeración entre 3 ° C y 7 ° C.
- No congelar.
- No exponga a la luz solar.
- Agitar el producto antes de usar.
- Una vez abierto el frasco, use todo el contenido.
- Destruir los frascos y residuos de vacunas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN:

Frascos x 1 000 dosis (500 ml)

REGISTRO: 4A-13846-AGROCALIDAD

FABRICADO Y COMERCIALIZADO POR: LAVETEC CÍA. LTDA.