

## COVEXIN-10



**Prevención de las enfermedades clostridiales en  
bovinos y ovinos**  
*Solución inyectable*



**COMPOSICIÓN:** Bacterina-toxoide de 10 vías que contiene toxoides de *C. perfringens* tipos A, B, C y D, *C. septicum*, *C. sordellii*, *C. novyi*, *C. haemolyticum* y *C. tetani*, además de células completas inactivadas de *C. chauvoei*. Adyuvantes acuosos de Sulfato de Aluminio y Potasio.

**INDICACIONES Y VENTAJAS:** Para la inmunización activa de bovinos y ovinos sanos contra enfermedades ocasionadas por *Clostridium chauvoei*, *Clostridium septicum*, *Clostridium haemolyticum*, *Clostridium novyi* tipo B, *Clostridium sordellii*, *Clostridium tetani* y *Clostridium perfringens* tipos A, B, C y D. Única con 10 vías reales de protección. Protección comprobada de un año frente a desafíos de campo. Puede utilizarse en hembras gestantes. Se recomienda su uso de 2 a 6 semanas antes del parto para conferir protección pasiva a sus becerros.

**DOSIS Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN:**

**BOVINOS:** Primovacunar con dos aplicaciones de 2 ml, vía subcutánea, con un intervalo de 4 a 6 semanas entre cada una. Posteriormente revacunar cada año.

**OVINOS:** Primovacunar con dos aplicaciones de 1 ml, administradas por vía subcutánea, con un intervalo de 4 a 6 semanas entre cada una. Posteriormente revacunar cada año.

Los becerros de madres no vacunadas vacunar a partir de las dos semanas de vida, los becerros de madres vacunadas deben recibir una primera dosis entre las 8 y 12 semanas de edad.

Se recomienda programar vacunaciones previo a los periodos de riesgo extremo como época de partos, trasquila o manejo del ganado.

**CONTRAINDICACIONES:** No vacunar animales enfermos o animales que puedan ser afectados por enfermedades subclínicas, estrés o inmunodeprimidos. El nivel de desempeño del producto puede verse afectado por las condiciones de uso, tales como estrés, clima, nutrición, enfermedad, parasitismo, idiosincrasias individuales o competencia inmunológica disminuida. El usuario debe considerar estos factores al evaluar el desempeño del producto.

**PRESENTACIONES:**

Envases x 25 dosis y 50 dosis (50 y 100 ml).

**ELABORADO POR:** INTERVET INTERNATIONAL

**DISTRIBUIDO POR:** IMPVET CÍA. LTDA.

Km 5,5 VÍA DAULE

**Telf.:** (04) 602-0410 / 09-9975-9666