

D'CANES ANTIPULGAS SPOT ON



Antipulgas, antiparasitario externo Solución



COMPOSICIÓN: Cada 1 ml contiene:

Fipronil.....	100 mg
Piryproxyfen.....	100 mg
Excipientes c.s.p.....	1 ml

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Antipulgas, antiparasitario externo.

FORMA FARMACÉUTICA: Solución.

INDICACIONES DE USO: D'CANES ANTIPULGAS SPOT ON está indicado para el tratamiento de pulgas, garrapatas y piojos en perros y gatos, y puede usarse también en el control de ácaros en perros. **D'CANES ANTIPULGAS SPOT ON** previene la infestación de pulgas por contaminación ambiental ya que actúa sobre estadios maduros e inmaduros del ciclo de vida del parásito y se recomienda como coadyuvante en el tratamiento para la dermatitis alérgica por pulgas.

D'CANES ANTIPULGAS SPOT ON bloquea la acción de los neurotransmisores GABA de las pulgas lo que genera una sobre-excitación de su sistema nervioso central y produce la muerte de estos insectos, además actúa como un análogo de las hormonas de las pulgas y garrapatas en estadios juveniles y larvarios, inhibiendo su crecimiento, maduración y desarrollo a la edad adulta.

La fórmula de doble acción de **D'CANES ANTIPULGAS SPOT ON** elimina pulgas, garrapatas y ácaros de tu mascota y su tecnología RCI (Regulador del Crecimiento de Insectos) detiene la incubación de huevos de pulgas y el desarrollo de larvas en tu hogar.

Este producto actúa completamente 24 horas después de aplicado sobre las pulgas y 48 horas de aplicado después sobre garrapatas, y su efecto persiste hasta por un mes después de su aplicación.

INDICADO PARA EL TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE:

Pulgas: *Ctenocephalides felis*
Ctenocephalides canis

Garrapatas: *Ixodes ricinus*
Ixodes scapularis
Ripicephalus sanguineus

Piojos: *Trichodectes canis*
Felicola subrostratus

Lipeurus
Goniocotes
Gonoides
Menopon
Menacanthus

Ácaros: *Cheyletiella sp.*
Cheyletiella blakei
Cheyletiella parasitivorax
Sarcoptes canis
Neotrombicula
Pneumonissoides

Claims:

- Contra pulgas
- Contra garrapatas
- Contra mosquitos
- Formulado con tecnología RCI

MODO DE ACCIÓN: La molécula de Fipronil inhibe la acción del flujo iónico del ácido gama-aminobutírico (GABA) debido a que tiene afinidad con los canales de cloro de los insectos. Consecuentemente, el enlace que el Fipronil forma con los canales de

cloro, bloquea la acción de relajación que tiene el GABA sobre el sistema nervioso lo que conlleva a la hiperexcitación neural; y a suficiente concentración puede causar también parálisis y muerte. El Fipronil muestra una acción selectiva 500 veces mayor en los insectos que en los mamíferos, esto debido primordialmente a las diferencias de afinidad en los complejos receptor-transmisor entre los insectos y mamíferos. En esencia, el Fipronil se liga de una manera más fuerte a los neuro-receptores GABA de los insectos que de los mamíferos.

El Piryproxyfen es una molécula que actúa como análoga de la hormona de crecimiento de los insectos en etapas juveniles, por lo que es utilizada dentro de su ciclo de maduración reemplazando el uso de la hormona natural. El Piryproxyfen elimina preferiblemente pulgas y garrapatas en su estado larvario ligándose y activando los receptores de hormona juvenil, y debido a esto no genera un efecto de maduración o crecimiento de los parásitos previniendo que las larvas se desarrollen a pulgas o garrapatas adultas. Es considerado una molécula que bloquea el crecimiento, impidiendo que continúe su ciclo de reproducción.

DOSIS SUGERIDA DE D'CANES ANTIPULGAS SPOT ON::

ANIMALES	PESO EN kg	DOSIS PRODUCTO EN ml
PERROS	1 a 10	0.67
	10 a 20	1.34
	20 a 40	2.68
	40 a 60	4.02
GATOS	1 a 10	0.5

FORMA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica. Se debe aplicar a manera de goteo sobre la espalda entre los hombros del animal. De ser necesario se puede aplicar en varios puntos entre el cuello y espalda. En perros de pelo largo es necesario abrir el pelaje y aplicar el producto para permitir que el líquido entre en contacto con la piel.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

- Mantener el envase bien cerrado.
- Se recomienda conservar a temperatura ambiente (15°C a 30°C) y 70% de HR.
- Proteger de la luz solar.
- Evitar temperaturas de almacenamiento por debajo de 15°C y por encima de 30°C.
- Evite el congelamiento.
- Almacenar el producto protegido de la luz solar.
- Mantener el envase bien cerrado.
- Una vez abierto el producto debe ser usado en su totalidad.

ADVERTENCIAS:

- No administrar en lugares de la piel que sufran abrasión severa del tejido debidas a dermatitis, laceraciones y otras patologías.
- No administrar en gatos menores a 12 semanas de edad.
- No administrar en perros menores a 10 semanas de edad.
- No bañar a los animales 48 horas después de aplicado el producto.
- En algunas ocasiones se puede presentar prurito.
- Pueden ocurrir reacciones de hipersensibilidad dérmica en gatos.
- En caso de presentar reacciones de hipersensibilidad dérmica, se recomienda bañar al animal con abundante agua y shampoo que no se indique como tratamiento insecticida.
- En caso de presentar sintomatología digestiva resultado de la administración oral accidental, se recomienda realizar un lavado gástrico, administrar carbón activado y productos laxantes.
- Venta bajo receta médica.
- No reutilizar este envase.
- No verter en afluentes de agua como ríos o arroyos.
- Se recomienda el uso de guantes para aplicar el producto y lavarse las manos luego de la manipulación.
- Cuando exista ingestión accidental se recomienda inducir al vómito y tener asistencia del Médico.

- Es poco probable que se presenten intoxicaciones por la aplicación de este producto.
- La toxicidad subaguda y crónica severa en perros y gatos puede ocasionar inapetencia, pérdida de peso y disminución del consumo de alimento.
- En caso de presentarse intoxicación por ingestión accidental repetida y continua del producto, la sintomatología del sistema nervioso puede ser convulsiones, temores, ataxia, comportamiento nervioso, hiper o hipoactividad, vocalizaciones, agresión, autolaceración, exagerada respuesta a reflejos, hiperexcitabilidad, inapetencia y respuestas neurológicas anormales.
- Actualmente no existe un tratamiento específico para las intoxicaciones que puedan presentarse debidas a este producto.

MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRESENTACIONES:

Pipeta x 0.5 ml

Pipeta x 0.67 ml

Pipeta x 1.34 ml

Pipeta x 2,68 ml

Q.F.R.: Nelly López de Cobo

REGISTRO: 2A1-14636-AGROCALIDAD

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR: C.C. Laboratorios Pharmavital
Cia Ltda, km. 7 ½ vía Quito, Ambato – Ecuador

Servicio al cliente: (593) 2 2806167 - (593) 2 2806436