

DICLOFENACO K



Antiinflamatorio no esterooidal
Solución inyectable



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Diclofenaco Potásico 5.000 mg
Vehículo c.s.p 100 ml

INDICACIONES: Es un potente antiinflamatorio no esterooidal con acción analgésica, antipirética.

Equinos: Alivia el dolor asociado con trastornos músculo-esqueléticos, inflamaciones, cojera, dolor abdominal, visceral, cólico, fiebre, etc.

Bovinos, ovinos y caprinos: Asociado con cualquier antibiótico. En caso de mastitis, dolores músculo-esqueléticos, fiebre, cólicos, traumatismos, inflamación por herida o cirugía, golpes, torceduras. En paresia post parto (vaca caída) quita el dolor y edema.

Porcinos: Síndrome de mastitis, metritis agalactia (MMA), con presencia de dolor, fiebre e inflamación en donde la antibioterapia no es suficiente.

DOSIS DICLOFENACO K:

Dosis recomendada: 2.5 mg/kg de peso vivo.		
ESPECIE	PESO (kg)	DOSIS
EQUINOS	50	2.5 ml
VACUNOS	100	5 ml
CERDOS	200	10 ml
OVINOS	300	15 ml
	400	20 ml
	500	25 ml
Dosis recomendada: 1.0 mg/kg de peso vivo.		
CAPRINOS	50	1 ml
	100	2 ml
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular.		

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular.

CONTRAINDICACIONES: No usar en caso de hipersensibilidad conocida a la sustancia activa.

No usar en animales que padezcan de trastornos gastrointestinales, como son lesiones ulcerativas, ya que el Diclofenaco agravaría la sintomatología y provocaría hemorragia.

No usar en animales con insuficiencia hepática, cardíaca o renal ni en animales con trastornos hemorrágicos.

ADVERTENCIAS: Administrar solo en las especies indicadas. En caninos puede provocar reacciones gastrointestinales.

No administrar a equinos cuya carne se destine al consumo humano.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA:

No se debe usar en animales gestantes.

En bovinos, la administración intramuscular puede originar dolor moderado y tumefacción transitoria en el punto de inyección.

REACCIONES ADVERSAS: En equinos, puede producirse anorexia y hemorragia incluso a la posología recomendada. Tras la administración intramuscular puede aparecer tumefacción transitoria en el punto de inyección.

Reacciones alérgicas pueden producirse en raras ocasiones.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN:

No administrar en conjunto con otros antiinflamatorios ya que aumenta el riesgo de aparición de reacciones adversas por lo que se recomienda no administrar simultáneamente con glucocorticoides, otros antiinflamatorios no esteroideos, ni con anticoagulantes.

Aminoglucósidos, glucocorticoides, AINE y otras sustancias con alto grado de unión a proteínas plasmáticas pueden competir por unirse a éstas y provocar efectos tóxicos. Debe evitarse la administración simultánea de sustancias activas potencialmente neurotóxicas.

TIEMPO DE RETIRO: **Carne:** 10 días. No utilizar en animales cuya leche se destine al consumo humano.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

Frasco x 10 ml.

Frasco x 50 ml.

Frasco x 100 ml.

REGISTRO: 8A4-8801-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador