

DIGESTAL



Antiemético - Antiflatulento
Cápsula blanda



COMPOSICIÓN: Cada cápsula blanda contiene:

Metoclopramida.....	10 mg
Excipientes:	
Simeticona.....	10 mg
Vehículo c.s.p.....	1 cápsula blanda

DOSIFICACIÓN DE DIGESTAL:

DOSIS: (0,33 mg/kg tres veces al día c/8 horas o 1 mg/kg una vez al día).

CANINOS	10 mg/10 kg cada 24 horas.
----------------	----------------------------

1 cápsula blanda por cada 10 kg de peso, cada 12 a 24 horas dependiendo de la patología y criterio del Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

INDICACIONES: DIGESTAL está indicado como antiemético, en vómito intenso intratable por quimioterapia o toxinas en sangre, así como el tratamiento de náuseas y vómito asociado al retraso del vaciamiento gástrico, reflujo gastroesofágico, reflujo por gastritis y úlcera péptica.

ESPECIE: Caninos.

ADVERTENCIAS:

- Dosificar de acuerdo a las instrucciones para evitar concentraciones subterapéuticas.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

ALMACENAMIENTO:

- Almacenar en un lugar fresco y seco protegido de la luz, a temperatura entre 15° C y 30° C.

VENTA: Bajo Receta del Médico Veterinario.

CONTRAINDICACIONES: La metoclopramida está contraindicada en pacientes con hemorragia, obstrucción o perforación gastrointestinal, y en aquellos con hipersensibilidad a la droga. Presenta una contraindicación relativa en presencia de desórdenes convulsivos. En los pacientes con feocromocitoma, la metoclopramida puede inducir una crisis hipertensiva.

USO DURANTE LA GESTACIÓN Y LACTANCIA: En un sistema separado de evaluación acerca de la seguridad de las drogas en la gestación canina y felina se categorizó a este fármaco como clase B. (Segura si se emplea en forma prudente). Los estudios en animales de laboratorio pudieron haber descubierto algún riesgo, pero estas drogas parecen ser seguras en perros o gatos, o son seguras si no son administradas durante la preñez avanzada. La metoclopramida se excreta en la leche donde puede alcanzar el doble del nivel plasmático, pero no parece representar un riesgo significativo para los lactantes.

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS:

Anestésicos: Con el uso concurrente por vía IV de la metoclopramida se ha documentado el desarrollo de hipotensión.

Atropina (y compuestos anticolinérgicos relacionados): Puede antagonizar los efectos de la motilidad gastrointestinal de la metoclopramida.

Drogas colinérgicas (por ejemplo, betanecol): Pueden favorecer los efectos gastrointestinales de la metoclopramida.

Depresores del SNC: La metoclopramida puede favorecer los efectos depresores sobre el SNC.

Ciclosporina: La metoclopramida aumenta la velocidad y la extensión de la absorción gastrointestinal.

Analgésticos opiáceos: Pueden antagonizar los efectos sobre la motilidad gastrointestinal de la metoclopramida.

Inhibidores de la MAO (incluyendo el amitraz): Podrían causar hipertensión.

Fenotiacínicos y Butirofenonas: Pueden potenciar los efectos extrapiramidales de la metoclopramida. Los efectos neurológicos centrales de la droga pueden ser aumentados por otros sedantes, tranquilizantes y narcóticos.

Tetraciclinas: La metoclopramida aumenta la velocidad y la extensión de la absorción gastrointestinal.

PRESENTACIÓN:

Caja x 10 cápsulas blandas

REGISTRO: 5C-15131-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador