

DOCTAM AD₃E

Antiparasitario de amplio espectro
Solución inyectable

**COMPOSICIÓN:** Cada ml contiene:

Doramectina	10 mg
Vitamina A propionato.....	50.000 UI
Vitamina D ₃	3.000 UI
Vitamina E acetato	20 UI
Vehículo c.s.p	1 ml

INDICACIONES: Es un antiparasitario de amplio espectro contra endoparásitos y ectoparásitos de bovinos, ovinos y porcinos.

Bovinos:

Parásitos gastrointestinales (adultos y cuarto estadio de larvas): *Haemonchus contortus*, *Haemonchus placei*, *Haemonchus similis*, *Ostertagia ostertagi* (incluyendo larvas inhibidas), *Ostertagia lyrata*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Trichostrongylus longispicularis*, *Cooperia oncophora* (incluyendo larvas inhibidas), *Cooperia punctata*, *Cooperia pectinata*, *Cooperia spatulata*, *Cooperia surnabada* (sin.: mcmasterii), *Oesophagostomum radiatum*, *Strongyloides papillosus*, *Nematodirus helvetianus*, *Nematodirus spathiger*, *Bunostomum phlebotomum*, *Trichuris discolor* y *Trichuris ovis* (adultos).

Parásitos pulmonares (adultos y cuarto estadio de larvas): *Dictyocaulus viviparus*.

Parásitos del ojo: *Thelazia* spp.

Ectoparásitos: Ácaros (*Sarcoptes scabiei*, *Psoroptes ovis*), piojos (*Haematopinus eurysternus*, *Linognathus vituli*, *Solenopotes capillatus*), Ura (*Dermatobia hominis*, *Hypoderma bovis*, *Hypoderma lineatum*), Bicheras (*Cochliomya hominivorax*). También está indicado como auxiliar en el control piojos masticadores (*Damalinea bovis*) y de la garrapata común del bovino (*Boophilus microplus*).

Ovinos:

Parásitos gastrointestinales: *Haemonchus contortus* (adultos, L4), *Ostertagia circumcincta* (adultos, L4, incluyendo larvas inhibidas), *Trichostrongylus axei* (adultos, L4), *Trichostrongylus colubriformis* (adultos, L4), *Trichostrongylus vitrinus* (adultos, L4), *Chabertia* spp., *Cooperia oncophora* (adultos, L4), *Cooperia curticei* (sólo L4), *Oesophagostomum venulosum* (sólo adultos), *Nematodirus* spp. (adultos, L4), *Trichuris* spp.

Parásitos pulmonares: *Dictyocaulus filaria*.

Ectoparásitos: Ácaros (*Psoroptes ovis*), miasis (*Cochliomya hominivorax*) gusano de la cabeza (*Oestrus ovis*).

Porcinos:

Parásitos gastrointestinales (adultos y cuarto estadio de larvas): *Ascaris suum*, *Hyostrongylus rubidus*, *Oesophagostomum dentatum*, *Oesophagostomum quadrispinulatum*, *Trichuris suis*, *Strongyloides ransomi* (adultos).

Parásitos pulmonares: *Metastrongylus* spp.

Parásitos renales: *Stephanurus dentatus*.

Ectoparásitos: Piojos (*Haematopinus suis*), ácaros (*Sarcoptes scabiei*).

DOSIS:

Bovinos y Ovinos: 1 ml/50 kg de peso vivo (200 ug/ kg de pv).

Porcinos: 1 ml/33 kg de peso vivo (300 ug/ kg de pv).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea o Intramuscular en bovinos y ovinos. En porcinos intramuscular.

CONTRAINDICACIONES: No usar en otras especies que no esté autorizadas.

ADVERTENCIAS: No administrar a vacas u ovejas en producción láctea con destino a consumo humano o industrialización.

No se debe utilizar en vacas que estén en período de producción o lactancia o cercanas al parto, dada la sensibilidad de los neonatos a la Doramectina.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA:

En estudios realizados en animales reproductores (toros y vacas con preñez temprana o avanzada), a una dosis igual a 3 veces la recomendada, no se detectaron efectos sobre el rendimiento reproductivo.

REACCIONES ADVERSAS:

No se han descrito efectos adversos. Las inyecciones IM pueden tener una mayor incidencia de daño tisular en el sitio de inyección durante la faena que las inyecciones SC.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN:

Se combina con febantel, fenbendazol, praziquantel, pirantel, Albendazol entre otros para aumentar su espectro.

TIEMPO DE RETIRO:

Bovinos: 35 días.

Ovinos: 35 días.

Porcinos: 28 días.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

Frasco x 10 ml

Frasco x 50 ml

Frasco x 100 ml

Frasco x 250 ml

Frasco x 500 ml

REGISTRO: 3A1-11182-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador