

DOMAX



Antiparasitario interno y externo *Solución inyectable*



DESCRIPCIÓN: Endectocida de larga acción, su eficacia y persistencia con niveles plasmáticos altos se debe a la fácil incorporación al tejido adiposo (liposolubilidad), lo que le permite tener una vida media larga.

COMPOSICIÓN: Cada ml contiene:

Doramectina 10 mg
Excipientes c.s.p. 1 ml

INDICACIONES: Antiparasitario de amplio espectro para el control de parásitos gastrointestinales y pulmonares; ectoparásitos como garrapatas, ácaros, piojos, larvas de insectos (nuche, gusaneras superficiales y cavitarias) en bovinos, ovinos y porcinos.

Su amplio margen de seguridad, permite usarlo en hembras gestantes, teniendo especial cuidado y bajo supervisión médica en el último tercio de gestación.

DOSIS:

Bovinos y ovinos: 200 ug/kg de peso, equivalente a 1 ml por cada 50 kg de peso vivo, vía intramuscular o subcutánea.

Porcinos: 300 ug/kg de peso, equivalente a 1 ml por cada 33 kg de peso vivo, vía intramuscular.

APLICACIÓN: Vía subcutánea o intramuscular profunda.
Uso veterinario.

ADVERTENCIAS:

- En las dosis recomendadas no causa reacciones adversas, en caso de presentarse aplicar antihistamínicos o epinefrina.
- No aplicar a vacas, cuya producción de leche está destinada al consumo humano.
- No utilizar junto con organofosforados.
- Evite que el producto contamine fuentes de agua, es nocivo para la fauna acuática.
- **Tiempo de retiro:** Carne de bovinos y ovinos: 35 días.
Porcinos: 28 días antes del sacrificio.
- Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Venta con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

Frasco x 10 ml.
Frasco x 50 ml.
Frasco x 100 ml.
Frasco x 500 ml.

REGISTRO: Ecuador Reg. No. 3A1-10461-AGROCALIDAD.

ELABORADO POR: JAMES BROWN PHARMA

Av. Interoceánica (E28C) Km. 23.5, Sector El Rosal, Barrio La Libertad, Pífo. Quito – Ecuador - PBX: (593-2) 399-7000 - www.jamesbrownpharma.com