

DOXICICLINA FARBIOVET



Antibiótico de amplio espectro
Polvo oral



COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene:

Doxiciclina Hiclato	95 g
Excipientes c.s.p	100 g

INDICACIONES: Es un antibiótico de amplio espectro indicado para el tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por bacterias Gram positivas y Gram negativas (*Bacillus anthracis*; *Clostridium* spp.; *Pasteurella* spp.; *Campylobacter* spp.; *Haemophilus* spp.; *Klebsiella* spp.; *Sphaerophorus necrophorus*; *Escherichia coli*; *Salmonella* spp.; *Shigella* spp.; *Actinobacillus* spp.; *Actinomyces bovis*; *Leptospira pomona*; *Moraxella bovis*; *Erysipelothrix insidiosa*; *Corynebacterium* spp.; *Listeria* spp.; *Streptococcus* spp.; *Staphylococcus* spp.) y microorganismo *Rickettsiaceae* (*Anaplasma* spp.).

En general la Doxiciclina Hiclato es muy activa contra *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp. y bacterias anaerobias, teniendo también muy buena actividad contra Micoplasmas, Ureaplasmas, Clamidas y Rickettsias.

DOSIS DE DOXICICLINA FARBIOVET:

Aves: Dosis de referencia 1 000 aves (20 mg Doxiciclina/kg p.v)

DOXICICLINA FARBIOVET	Alimento	Edad semanas	Peso promedio
3,470 g	11,8 kg	0 a 1	165 g
8,420 g	16,8 kg	1 a 2	400 g
18,90 g	23,1 kg	2 a 3	900 g
29,47 g	29,9 kg	3 a 4	1.400 g
42,11 g	35,8 kg	4 o más	2.000 g

Porcinos: Dosis de referencia 100 cerdos (10 mg Doxiciclina/kg p.v)

DOXICICLINA FARBIOVET	Alimento	Edad semanas	Peso promedio
1,0-12 g	22,72 kg	0 a 6	0,91-11 kg
12-27 g	68,18-90,90 kg	7 a 11	11-25 kg
27-58 g	136,36-227,27 kg	11 a 18	25-55 kg
58-95 g	227,27-272,72 kg	18 a más	55-90 kg

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

PREPARACIÓN: Con el alimento o con agua de bebida.

CONTRAINDICACIONES: En animales con sensibilidad a las tetraciclinas. No administrar conjuntamente con caolín, antiácidos y preparaciones de hierro y aluminio. No administrar en hembras preñadas.

ADVERTENCIAS: La doxiciclina, no debe usarse durante la preñez. No administrar en gallinas productoras de huevo para consumo humano.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA: En hembras gestantes está contraindicado el uso del fármaco ya que podría causar malformaciones congénitas o embriotóxicas. Las tetraciclinas se excretan en la leche, evitar la lactancia si la madre está recibiendo doxiciclina. Las tetraciclinas pueden retardar el desarrollo del esqueleto fetal

y colorear los dientes.

REACCIONES ADVERSAS: Náuseas y vómitos, para aliviar estos efectos, la droga se puede administrar con alimento, sin producir una reducción clínicamente significativa de su absorción.

La administración oral de doxiciclina ha sido implicada como causa de estenosis esofágica en animales, proporcionar agua a voluntad. El tratamiento con tetraciclinas (en especial el que se hace a largo plazo) puede producir el sobre desarrollo de bacterias u hongos no susceptibles (superinfección).

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN:

No administrar antiácidos con tetraciclinas por vía oral ya que quelan los cationes di o trivalentes, lo que disminuye la absorción de las primeras o de la droga que contenga tales cationes. Los antiácidos orales, los catárticos salinos u otros productos gastrointestinales que contengan cationes de aluminio, calcio, magnesio, zinc o bismuto son los productos asociados con mayor frecuencia con esta interacción. La doxiciclina tiene una afinidad relativamente baja para los iones de calcio, pero se recomienda que todas las tetraciclinas orales se administren 1-2 horas antes o después del producto que contiene los cationes.

El subsalicilato de bismuto, caolín pectina puede reducir la absorción de la doxiciclina.

El hierro por vía oral por disminuir la absorción de las tetraciclinas, debe administrarse, 3 horas antes o 2 horas después de la dosis de tetraciclinas.

No combinar con penicilinas, cefalosporinas o aminoglucósidos por ser antagonistas.

El fenobarbital puede disminuir la vida media de la doxiciclina y reducir los niveles.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C y humedad entre 70 % a 80%. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

Sobre x 500 g.

Sobre x 1 kg.

REGISTRO: 2C1-13420-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador