DOXIM PET

FARBIO PHARMA

Antibiótico de amplio espectro
Comprimidos

COMPOSICIÓN: Cada comprimido contiene:
Doxiciclina .....100 mg
Excipientes c.s.p. .....1 comprimido
Cada comprimido contiene:
Doxiciclina .....200 mg
Excipientes c.s.p. .....1 comprimido

INDICACIONES: Es un antibiótico de amplio espectro indicado para el tratamiento de enfermedades infecciosas locales o sistémicas causadas por bacterias Gram positivas y negativas, incluyendo micoplasmas, ricketssias y algunos protozoos.

DOSIFICACIÓN DE DOXIM PET 100 mg:

ESPECIE	COMPRIMIDO	PESO	DURACIÓN DEL TRATAMIENTO
FELINOS CANINOS	**Referencial:** 5-10 mg/kg/12 horas		**Caninos:** Uso general para infecciones de 7-10 días, cada 12 horas, en enfermedad de Lyme o Ehrlichiosis monocítica canina usar el doble de la dosis recomendada, cada 24 horas de 20-40 días. **Felinos:** De 21 a 28 días para infecciones susceptibles, para Ehrlichiosis felina, anaplasmosis toxoplasmosis, cada 12 horas.
	¼ comprimido	5 kg	
	½ comprimido	10 kg	
	1 comprimido	20 kg	
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral, acompañado con alimento.			

DOSIFICACIÓN DE DOXIM PET 200 mg:

ESPECIE	COMPRIMIDO	PESO	DURACIÓN DEL TRATAMIENTO
CANINOS	**Referencial:** 5 - 10 mg/kg/12 horas		**Caninos:** Uso general para infecciones de 7-10 días, cada 12 horas, en enfermedad de Lyme o Ehrlichiosis monocítica canina usar el doble de la dosis recomendada, cada 24 horas de 20-40 días.
	½ comprimido	20 kg	
	1 comprimido	40 kg	
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral, acompañado con alimento.			

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

CONTRAINDICACIONES: Contraindicado en animales con antecedentes de sensibilización a las tetraciclinas.

ADVERTENCIAS: La Doxiciclina Hiclato es un antibiótico derivado de la Oxitetraciclina, por lo que NO debe usarse durante la preñez. No administrar conjuntamente con antiácidos, caolín y preparaciones de hierro y aluminio.
Solo para uso oral
La Doxiciclina tiene efectos sinérgicos con la rifampicina y la estreptomicina para tratamiento de la brucelosis.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA: En hembras gestantes está contraindicado el uso del fármaco ya que podría causar malformaciones congénitas o embriotóxicas.
Las tetraciclinas se excreta en la leche, evitar la lactancia si la madre está recibiendo doxiciclina.
Las tetraciclinas pueden retardar el desarrollo del esqueleto fetal y colorear los dientes.

REACCIONES ADVERSAS: Los efectos adversos informados con mayor frecuencia en relación con la administración oral de doxiciclina en perros y gatos son náuseas y vómitos. Para aliviar estos efectos, la droga se puede administrar con alimento, sin producir una reducción clínicamente significativa de su absorción.
La administración oral de doxiciclina ha sido implicada como causa de estenosis esofágica en gatos. Si se usan tabletas para administración oral, asegurarse que después de ingerir la pastilla, el animal tome al menos 6 ml de agua. No administrar la pastilla en seco.
El tratamiento con tetraciclinas (en especial el que se hace a largo plazo) puede producir el sobredesarrollo de bacterias u hongos no susceptibles (superinfección).

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: Cuando se administran antiácidos orales, las tetraciclinas pueden quelar los cationes di o trivalentes, lo que puede disminuir la absorción de éstos o de la doxiciclina. Los antiácidos orales, los catárticos salinos u otros productos gastrointestinales que contengan cationes de aluminio, calcio, magnesio, zinc o bismuto, son los productos asociados con mayor frecuencia con esta interacción.
La administración de doxiciclina juntamente con subsalicilato de bismuto o caolín pectina puede reducir la absorción de esta.
Los productos con hierro administrados por vía oral se asocian con disminución de la absorción de las tetraciclinas; las sales de hierro deben administrarse 3 horas antes o 2 horas después de la dosis de tetraciclinas.
Las drogas bacteriostáticas, como las tetraciclinas, pueden interferir con la actividad bactericida de las penicilinas, las cefalosporinas y los aminoglucósidos.
El fenobarbital puede disminuir la vida media de la doxiciclina y reducir sus niveles.
Las tetraciclinas pueden disminuir la actividad de la protrombina plasmática y los pacientes bajo tratamiento anticoagulante (warfarina) pueden necesitar ajuste de dosis.

TIEMPO DE RETIRO: Ninguno.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura Entre 15ºC y 30ºC. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN:
Caja x 12 comprimidos.

REGISTRO: 2C1-13969-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.
Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha
Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag
Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021
SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246
www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador