

DRONTAL® PUPPY



Desparasitante interno
Oral



COMPOSICIÓN: cada 100 ml contiene:

Pamoato de Pirantel	
(equivalente a 0,5 g de Pirantel base)	1.44 g
Febantel	1.50 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

INDICACIONES: Indicado en cachorros y perros jóvenes para el tratamiento de infestaciones ocasionadas por: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinari stenocephala*, *Ancylostoma caninum*, *Giardia* sp., *Ancylostoma braziliense* y *Trichuris vulpis*.

MODO DE EMPLEO Y DOSIS:

Verifique el peso del cachorro. El líquido puede ser mezclado con el alimento, con carne o directamente administrado depositándolo en el fondo de la boca del perro. **DRONTAL® PUPPY** es muy bien tolerado y puede ser administrado con el estómago lleno.

DOSIS: Administrar como dosis única 1 ml por kilogramo de peso del cachorro, o su equivalente a 15 mg de Febantel y 14.4 mg de Pirante. En caso de Giardiasis, administrar 2 días consecutivos. Agite antes de usar.

RECOMENDACIONES: En el caso de *Ancylostoma caninum*, cada adulto ingiere alrededor de 0.1 ml de sangre por día, por lo que infestaciones severas pueden ser fatales, sobre todo en los cachorros. Las larvas de este parásito pasan por las glándula mamaria a la leche, penetran la piel sana del perro o el hombre o son ingeridas a través del ambiente que se encuentra contaminado. El *Toxocara canis* infesta atravesando la glándula mamaria, atravesando la barrera transplacentaria o por ingestión de los huevos del medio ambiente.

Las larvas de estos últimos parásitos pueden permanecer inactivas en la musculatura de la perra, produciendo infestaciones por varios partos consecutivos. Junto con la desparasitación debe realizarse una limpieza rigurosa del ambiente con productos a base de cloro, que es efectivo contra larvas y huevos de los parásitos.

REGIMEN DE DESPARASITACIÓN: El programa de desparasitación recomendado por el Colegio Americano de Parasitólogos Veterinarios es el siguiente:

Se inicia la desparasitación a los 15 días de edad, se continúa cada 15 días hasta los tres meses, luego una vez al mes a los 4, 5 y 6 meses, luego cada tres meses durante el resto de la vida del perro. Las hembras de cría se desparasitan antes de la cría y al momento del parto, se pueden realizar desparasitaciones concomitantemente con los cachorros.

Consulte a su Médico Veterinario para adecuar el tratamiento para cada caso particular.

CONTRAINDICACIONES: Los estudios indican un amplio margen de seguridad, sin contraindicaciones o efectos colaterales.

Interacciones con otros medicamentos: No se recomienda administración simultánea con Piperazina.

AMACENAMIENTO: Consérvese entre 5°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños.

MATERIAL DE EMPAQUE: Caja de cartón, con ambos extremos de cierre manual.

Frasco plástico con tapa rosca de seguridad + una jeringa plástica transparente.

CONCEPTO TOXICOLÓGICO: No Aplica.

VIDA ÚTIL: 36 meses.

PRESENTACIÓN:

Caja x 1 frasco x 20 ml.

REGISTRO: 3A2-6662-AGROCALIDAD.

FABRICADO POR: BAYER KVP PHARMA - ALEMANIA

DISTRIBUIDO POR: ELANCO