

ECTOMATE®




Insecticida de uso zosanitario



Es un emulsionable concentrado de color amarillo.

COMPOSICIÓN:

Cipermetrina	3 %
Imidacloprid	3 %
Excipientes c.s.p.	100 ml

ECTOMATE® es un insecticida en forma de concentrado emulsionable que combina las propiedades de choque y volteo a bajas concentraciones propias de la Cipermetrina, con el potente y prolongado efecto residual del Imidacloprid.

Este último compuesto tiene propiedades larvicidas además de pocas resistencias conocidas que, unidas al efecto de choque de la Cipermetrina, aumentan el efecto sinérgico de un modo asombroso. De este modo se obtienen unos insuperables resultados en la desinsectación de instalaciones para animales, frente a insectos voladores (moscas, mosquitos, tábanos, avispas, etc.), insectos rastreros (piojos, pulgas, escarabajos, chinches, cucarachas, hormigas, etc.), arácnidos (garrapatas, ácaros, arañas, etc.).

USOS Y APLICACIONES: **ECTOMATE®** se usa para la desinsectación de todo tipo de instalaciones donde viven animales (ganaderas, avícolas, porcinas, perreras, zoológicos, etc.). Eliminan todas las especies de insectos, de manera eficaz y persistente: moscas (*Stomoxys calcitrans*, *Fannia canicularis*, *Haematobia irritans*), mosquitos (*Aedes albopictus*), tábanos, avispas (*Vespa velutina*), etc., e insectos rastreros (piojos, pulgas, escarabajos (picudo rojo), chinches, cucarachas, hormigas, etc.), arácnidos (chinchorros (*Ornithodoros* spp.), garrapatas, ácaros (*Dermanyssus gallinae*), arañas, etc.).

VÍA Y FORMA DE APLICACIÓN: Antes de aplicar el producto, eliminar de las áreas a tratar los residuos orgánicos (heces, orina) que puedan encontrarse y la suciedad en general. Realizar el tratamiento en ausencia de animales y evitar su acceso a la zona tratada después del tratamiento, respetando su tiempo de re-entrada (8 HORAS).

Aplicar **ECTOMATE®** directamente sobre las superficies donde los insectos se posan y en, zócalos, hendiduras donde se esconden y ponen huevos.

DOSIS Y PREPARACIÓN DEL PRODUCTO PARA SU CORRECTO USO: **ECTOMATE®** se emplea emulsionado en agua a concentraciones entre el 1-1,5%.

Diluir 10-15 ml de producto en 1 litro de agua y aplicar.

Una vez mezclado **ECTOMATE®** debe aplicarse por pulverización fina sobre las superficies a tratar, de la siguiente manera:

Superficies no porosas o limpias: 5 l de producto preparado por cada 100 m².

Superficies porosas o sucias: 10 l de producto preparado para tratar 100 m² para superficies permeables o con restos de materia orgánica.

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO: La administración de **ECTOMATE®** siempre da lugar a efectos fuertemente tóxicos en la especie de insecto a que se destina y este es el objetivo perseguido.

TOXICIDAD: La intoxicación puede provocar:

- Irritación de ojos, piel, mucosas y tracto respiratorio.
- Náuseas, dolor de cabeza, vértigo, incoordinación, depresión del SNC y narcosis.
- Acidosis metabólica, edema pulmonar, neumonía química por

aspiración y fallo cardiorrespiratorio.

Dermatitis de contacto y anestesia en zonas localmente afectadas.
Precauciones que deben adoptarse antes, durante o después de su administración:

La eficacia del producto puede verse disminuida en presencia de altas temperaturas.

Evitar trabajar en la nube de pulverización.

Ventilar bien la zona tratada antes de la re-entrada. El plazo de seguridad es de 8 horas.

ADVERTENCIAS: Elimínese como RESIDUO PELIGROSO el producto sobrante y su recipiente. Mantenga el mismo, lejos de alimentos, bebidas y piensos. Las recomendaciones e información que se facilitan son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización, puede intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (aplicación, climatología, etc.). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

RECOMENDACIONES PARA CASO DE INTOXICACIÓN O ACIDENTE:

- Retire a la persona de la zona contaminada y quite la ropa manchada o salpicada.
- En contacto con los ojos, lavar con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón, sin frotar.
- En caso de ingestión, NO provoque el vómito. No administrar nada por vía oral.
- Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

CONSEJOS TERAPÉUTICOS: En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de conciencia.

Carbón activado: La dosis más recomendada y única es de 25 g en el adulto (disuelta en 200 ml de agua templada) y de 1 g/kg de peso en el niño.

Control del equilibrio ácido-base.

Tratamiento sintomático.

PRESENTACIONES:

Frasco x 200 ml

Frasco x 1 litro

REGISTRO: 3B2-14375-AGROCALIDAD

FABRICADO POR: BIOPLAGEN

DISTRIBUYE PARA EL ECUADOR: TADEC CÍA. LTDA. Ambato - Quito - Guayaquil - Cuenca - Balsas - Sto. Domingo.

Servicio al cliente: +593 32-855 035