

ELANCOBAN™ 200



Coccidiostato ionóforo granulado
Sólido



COMPOSICIÓN:

Monensina Sódica200 g
Subproductos de granos y/o carbonato
de calcio suficiente para1 000 g

INDICACIONES: Para el control de la coccidiosis causada por *E. necatrix*, *E. tenella*, *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. mivati*, y *E. máxima*, en pollos de engorde y aves de levante. En pavos se recomienda para el control de *E. adenoides* y *E. gallopavonis*.

IMPORTANTE: Debe ser mezclado cuidadosamente en el alimento antes de usarse.

PRECAUCIONES: No permitir el acceso a caballos y otros equinos a fórmulas que contengan **ELANCOBAN™ 200**. La ingestión de **ELANCOBAN™ 200** en equinos puede ser fatal.

En pavos: Usar solamente para animales que van al matadero. No usar en reproductores. No usar alimento que contenga **ELANCOBAN™ 200** en aves en producción.

CONTRAINDICACIONES: Aves que consumen **ELANCOBAN™ 200** no deben tratarse con productos que contengan Tiamulina o Troleandomicina. Puede ocurrir una severa depresión en el crecimiento

ADVERTENCIAS: Cuando se mezcla y transporta **ELANCOBAN™ 200** debe usar ropa protectora, guantes impermeables y máscara antipolvo, si ocurre contacto accidental con los ojos, enjuagar inmediatamente con agua. Los operadores tendrán que lavarse cuidadosamente con agua y jabón después de manejar el producto.

INSTRUCCIONES DE MEZCLADO:

Pollos y aves de levante: Mézclase cuidadosamente de 0.5 a 0.6 kg de **ELANCOBAN™ 200** en una tonelada métrica de alimento para obtener de 100 a 120 g de monensina (100-120 ppm).

Pavos: Mézclase de 0.3 a 0.5 kg. de **ELANCOBAN™ 200** en una tonelada de alimento para obtener de 60 a 100 gramos de monensina (60-100 ppm).

Se recomienda mezclar cuidadosamente el **ELANCOBAN™ 200** en una pequeña cantidad de alimento terminado (20-50 kg) antes de incorporarlo al volumen total del alimento. Este procedimiento contribuye a una homogénea distribución del producto en el alimento final.

INSTRUCCIONES PARA SU ADMINISTRACIÓN:

Pollos: Debe ser administrado continuamente en la ración alimenticia.

Aves de levante: Úsese continuamente en el alimento desde el primer día de edad hasta que las aves sean llevadas a jaulas.

Pavos: Úsese continuamente en el alimento desde el primer día, hasta las 16 semanas de edad.

ALMACENAMIENTO: Almacene en un sitio fresco y seco. A temperatura ambiente entre 0°C - 25°C.

ESTE PRODUCTO NO DEBE SER USADO DESPUÉS DE LA FECHA DE EXPIRACIÓN IMPRESA EN EL SACO.

PRESENTACIÓN:

Saco x 25 kg.

REGISTRO: 1-3A4-5876-AGROCALIDAD

ELABORADO POR: ELANCO