

ENFLOX 5% INYECTABLE



Antibiótico
Solución inyectable



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Enrofloxacina Base..... 5,0 g
Vehículo c.s.p..... 100 ml

INDICACIONES: Está indicado en el tratamiento y control de salmonelosis, colibacilosis, infecciones respiratorias, digestivas, urinaria, de piel, otitis y mastitis producidas por gérmenes Gram positivos, Gram negativos y micoplasmas.

DOSIS:

Bovinos, ovinos y equinos: Dosis de referencia 2,5-5 mg enrofloxacina/ kg pv/día. Aplicar 5-10 ml/100 kg pv cada 24 horas.

Porcinos: Dosis de referencia 5 mg enrofloxacina/ kg pv/día. Aplicar 10 ml/100 kg pv cada 24 horas.

Caninos y felinos: Dosis de referencia 20 mg enrofloxacina/kg pv/día. Aplicar 1 ml/2,5 kg pv cada 24 horas.

Se recomienda de 3 a 7 días consecutivos de tratamiento. Salvo mejor criterio del Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular.

ADVERTENCIAS: Hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes. Está contraindicado en animales muy jóvenes. No aplicar junto a compuestos como Aluminio, Calcio, Hierro o Magnesio reduce la absorción por quelación.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA: La seguridad de enrofloxacina en las perras gestantes ha sido investigada. Las perras en servicio, preñadas y en lactancia que reciben hasta 15 mg/kg/día no mostraron efectos relacionados con la droga. Debido al riesgo de alteraciones cartilagosas en animales jóvenes, no suele recomendarse el uso de fluoroquinolonas durante la preñez a menos que los beneficios del tratamiento superen claramente a los riesgos. En caninos machos con varias dosis no han mostrado efecto sobre el rendimiento reproductivo de éstos.

La seguridad en gatas en servicio, preñadas o en lactancia no ha sido establecida.

REACCIONES ADVERSAS: Con la excepción de las posibles anormalidades cartilagosas en los animales jóvenes, el perfil de efectos adversos de la enrofloxacina suele limitarse a alteraciones gastrointestinales (vómito, anorexia).

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: La administración oral de Hierro y/o Zinc disminuye la absorción de la enrofloxacina.

El hierro y zinc por vía oral disminuye la absorción de la enrofloxacina, de debe separar la administración de estos productos por un periodo no inferior a 2 horas.

TIEMPO DE RETIRO: Carne 28 días. No es recomendable utilizada en vacas lecheras o que estén próximas a parir.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

Viales x 10 ml.

Viales x 100 ml.

REGISTRO: 2C1-13674-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador