ENFLOX 50

FARBIO PHARMA

Antibiótico de amplio espectro
Comprimidos saborizados

COMPOSICIÓN: Cada tableta contiene:
Enrofloxacina.....50 mg
Excipientes c.s.p.....1 tableta

DOSIFICACIÓN DE ENFLOX 50:

ESPECIE	PESO (kg)	DOSIS (5 mg/kg)
CANINOS FELINOS	2,5 5 10 Hasta 15	1/4 tableta 1/2 tableta 1 tableta 1 tableta y media
INTERVALO ENTRE DOSIS	**Dosis:** 5-20 mg/kg 1 toma cada 24 horas. En felinos no administrar más de 5 mg/kg. La dosis puede ser modificada a indicación expresa del Médico Veterinario.	
VÍA DE ADMINISTRACIÓN:	Oral.	
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:	Se recomienda 7-14 días consecutivos, debiendo continuar al menos 2-3 días más allá de la desaparición de los signos clínicos, salvo mejor criterio del Médico Veterinario.	

INDICACIONES: ENFLOX 50 es un antibacteriano de amplio espectro, indicado para el manejo de enfermedades causadas por bacterias Gram negativas, algunas Gram positivas y micoplasma que afecten el aparato respiratorio, digestivo, urinario, auditivo o piel en caninos y felinos.

ESPECIES DE DESTINO: Caninos y Felinos.

ADVERTENCIAS O PRECAUCIONES:
- No administrar a pacientes alérgicos a las quinolonas.
- Puede desarrollarse daños cartilaginosos (artropatías, erosión de cartílagos articulares) en animales que están en crecimiento.
- No administrar el medicamento a pacientes deshidratados puede causar cristaluria.
- No administrar el medicamento en hembras gestantes o en periodo de lactancia.
- Los pacientes con grave deterioro de la función renal o hepática puede requerir un ajuste de las dosis para evitar la acumulación de la droga.

ALMACENAMIENTO:
- Almacenar a temperaturas de entre 15 - 30 ºC y humedad inferior a 75%.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

TIPO DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

USO DURANTE LA GESTACIÓN Y LACTANCIA: La seguridad de la enrofloxacina en las perras gestantes ha sido investigada. Las perras en servicio, preñadas y en lactación que reciben hasta 15 mg/kg/día no mostraron efectos relacionados con la droga. Sin embargo, debido a los riesgos de alteraciones cartilaginosas en animales jóvenes, no suele recomendarse el uso de fluoroquinolonas durante la preñez a menos que los beneficios del tratamiento superen claramente a los riesgos. Estudios limitados en caninos machos con varias dosis no han mostrado efectos sobre el rendimiento reproductivo de éstos.
La seguridad en gatas en servicio, preñadas o en lactación no ha sido establecida.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:
Antiácidos/productos lácteos: Los productos que tengan los cationes de Mg, Al, Ca pueden unirse a la enrofloxacina y evitar su absorción, por lo que deben administrarse con un intervalo mínimo de 2 horas.
Aminoglucósidos, cefalosporinas de 3° generación, penicilinas de espectro extendido: Junto con estas se ha identificado presencia de sinergismo, pero no actúan bien contra algunas bacterias.
Ciclosporina: Las fluoroquinolonas pueden exacerbar la nefrotoxicidad y reducir el metabolismo de la ciclosporina (usada por vía sistémica).
Flunixina: Se ha observado que en los perros está aumenta la vida media de eliminación de la enrofloxacina, y ésta última aumenta la curva y vida media de eliminación de la flunixina.
Warfarina: Es posible un aumento de los efectos de la warfarina.
Teofilina: La enrofloxacina/ciprofloxacina puede aumentar los niveles de teofilina en sangre.
Hierro, Cinc (por vía oral). Disminuyen la absorción de la enrofloxacina, separar la administración de estos productos por un período no inferior a 2 horas.

PRESENTACIÓN:
Caja x 10 comprimidos saborizados

REGISTRO: 2C1-15045-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.
Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha
Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag
Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021
SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246
www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador