

## ENROXIL 5%®



### Antibacteriano de amplio espectro

Solución inyectable



#### COMPOSICIÓN: 1 ml de ENROXIL 5% contiene:

Enrofloxacin..... 50 mg

**INDICACIONES:** Prevención y tratamiento de procesos infecciosos causados por: *Mycoplasma* sp., *E. coli*, *Haemophilus* sp., *Streptococcus*, *Salmonella*.

En enfermedades como: Coriza, Bronconeumonías, ERC, Síndrome MMA, Colisepticemia, Enterotoxemia, Pasteurelosis, Salmonelosis.

En pollos, pollitas y pavos, tanto de engorde como reproductoras, así como también en pequeñas especies.

**En Cerdos:** Infecciones del aparato respiratorio y digestivo (pasteurelosis, micoplasmosis, colibacilosis, colisepticemia, síndrome MMA, Rinitis atrófica, neumonía enzoótica).

**En Bovinos:** Enfermedades bacterianas del aparato respiratorio y digestivo (pasteurelosis, micoplasmosis, colibacilosis, colisepticemia, salmonelosis) así como infecciones por enfermedades secundarias después de problemas virales. Por ej: Complejo respiratorio bovino.

**ADMINISTRACIÓN:** ENROXIL 5% se aplica mediante inyección subcutánea (SC) en terneros e intramuscular (IM) en cerdos.

#### DOSIS:

**Bovinos y porcinos:** Dosis básica 0.5 ml por 10 kg de peso corporal por 3 días.

**En aves:** Se aplica una dosis de 0.5 ml vía intramuscular, inyectada en la pechuga.

El resultado esperado con el tratamiento con ENROXIL 5% se obtiene al primer día, con una baja de mortalidad de un 80%, el segundo día se reduce aún más la mortalidad y se incrementa el consumo de alimento, al tercer día se obtiene la recuperación del animal.

#### PRESENTACIONES:

Frasco x 100 ml.

Frasco x 250 ml.

**REGISTRO:** 3B3-6254-AGROCALIDAD.

**ELABORADO POR:** VETANCO (ARGENTINA) BAJO LICENCIA TADEC.

**DISTRIBUYE PARA EL ECUADOR:** TADEC CÍA. LTDA. Ambato - Quito - Guayaquil - Cuenca - Balsas - Sto. Domingo.  
Servicio al cliente: +593 32-855 035