

ESTREPTOPEN



Antibiótico de amplio espectro y antiinflamatorio
Vía intramuscular profunda



COMPOSICIÓN: Reconstituido a 20 ml contiene:

Penicilina G Benzatínica.....	3 000 000 UI
Penicilina G Procaínica	1 500 000 UI
Penicilina G Potásica.....	1 500 000 UI
Sulfato de Dihidroestreptomicina.....	7 000 mg
Flunixin Meglumine.....	12 mg
Excipientes c.s.p.	20 ml

GENERALIDADES: Combinación antibiótica de amplio espectro y antiinflamatorio no esterooidal, de administración parenteral de larga acción, para el tratamiento de procesos infecciosos causados por microorganismos sensibles a la penicilina y estreptomicina.

PROPIEDADES: La combinación de penicilinas ofrece una acción inmediata (Penicilina G potásica y Penicilina procaínica), una acción prolongada (Penicilina G benzatínica), que actúan contra bacterias Gram +.

La estreptomicina actúa contra bacterias Gram - lo que le confiere un amplio espectro de acción.

El Flunixin Meglumine, inhibe la producción de prostaglandinas y leucotrienos liberados, por los efectos citotóxicos de las toxinas bacterianas y endotoxinas.

INDICACIONES: Para el tratamiento de neumonías, bronconeumonías, neumoenteritis, nefritis, pielonefritis, cistitis, metritis, mastitis, septicemias, adenitis equina, absceso interdigital, carbunco, tétanos, leptospirosis. Indicado para bovinos, ovinos, equinos, porcinos, caprinos y caninos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Vía intramuscular profunda.

DOSIS DE ESTREPTOPEN:

ESPECIES	ml
BOVINOS Y EQUINOS ADULTOS	1 ml / 20kg de peso.
POTROS, TERNEROS, OVINOS Y CERDOS	5 ml / 50 kg de peso. En la práctica 1 ml / 20 kg de peso.
CANINOS	1 ml / 10 kg como dosis general.

Se puede repetir a las 48-72 horas, según criterio profesional.

TIEMPO DE RETIRO:

Leche: 72 horas después del último tratamiento.

Carne: 21 días después del último tratamiento.

PRECAUCIONES:

- No administrar junto con antibióticos bacteriostáticos.
- No administrar a animales susceptibles a las penicilinas.
- Almacenar en sitio fresco, seco, protegido de la luz, a menos de 30 ° C y Humedad Relativa de 65 % ± 5 %.
- Una vez abierto el frasco, utilizar todo el contenido.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Elimine el envase luego de utilizar el producto.

PRESENTACIÓN:

Frasco x 20 ml (del producto reconstituido).

REGISTRO: 2C2-11765-AGROCALIDAD.

FABRICADO Y COMERCIALIZADO POR: LAVETEC CÍA. LTDA.