

ESTRUMATE®


MSD

Salud Animal


IMPVET

Prostaglandina sintética, a base de Cloprostenol para bovinos, equinos y cerdos

Solución inyectable



COMPOSICIÓN:

Cloprostenol sódico:..... 263 mcg

Equivalente a 250 mcg Cloprostenol.....

Clorocresol (Bactericida)

Solución acuosa incolora c.s.p.:..... 0.1% p/v 1ml

ACCIÓN: Hormonal. Luteolítica.

Produce regresión morfológica y funcional del cuerpo lúteo, seguido por el retorno del celo 2 a 4 días después del tratamiento con ovulación normal. Tener en cuenta que hay un período fisiológico refractario a las prostaglandinas, de 4 a 5 días después de la ovulación.

ESTRUMATE tiene un buen margen de seguridad y no perjudica la fertilidad.

INDICACIONES: Está indicado para el control de la reproducción. Sincronización del ciclo estral en ganado de carne: facilita el empleo de la inseminación artificial, se evitan los problemas de detección de celo y se posibilita estacionar los partos.

En ganado lechero la sincronización del celo permite tener un mejor control del índice de partos, disminuyendo el número de vacas abandonadas como estériles.

Usos terapéuticos: Celos silenciosos, quistes luteales, inducción al parto, inducción del aborto, eliminación de fetos momificados, tratamiento coadyuvante de endometritis crónica y piómetras.

Cerdas: Inducción al parto y Metritis (post-parto).

Yeguas: Tratamiento del cuerpo lúteo persistente e Inducción del estro.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS: No se debe administrar a hembras preñadas a menos que se desee la inducción del parto o del aborto. Se puede absorber a través de la piel, por lo tanto no debe ser manipulado por mujeres embarazadas o personas asmáticas. Lavar inmediatamente con agua cualquier derrame accidental sobre la piel.

Prostaglandinas del tipo F2 pueden causar en el hombre broncoespasmos aunque no se conoce la posible incidencia de este efecto con **ESTRUMATE**. Si se produjera inhalación accidental o inyección ocasionando un impedimento respiratorio está indicado un broncodilatador de acción rápida, por ejemplo isoprenalina o salbutamol por inhalación.

Ocasionalmente puede producir:

Vacas: Intranquilidad.

Cerdas: Aumento de la micción y de la defecación; ligera inquietud.

Yeguas: Sudoración; trastornos abdominales; postración.

En caso de producirse, estos efectos se observan dentro de los 15 minutos post-inyección y suelen desaparecer al cabo de una hora.

- La inducción del parto o del aborto con cualquier compuesto exógeno puede precipitar la distocia, muerte fetal, retención placentaria y/o metritis.

APLICACIÓN Y DOSIFICACIÓN: Inyección intramuscular.

Vacas: 2 ml/vaca. Control de la reproducción: aplicar una segunda dosis a los 11 días (10-14 días) de la primera, para controlar la aparición de celos cíclicos. En los casos de celo silente e inducción y sincronización del estro, las vacas salen en celo y ovulan a los 2-5 días posteriores al tratamiento, pudiéndose llevar a cabo la monta natural o la inseminación a las 72 horas y 96 horas si-

guientes a su aplicación. Para interrupción de la preñez o en los casos de inducción al aborto: inyectar entre la primera semana y el 5º mes de gestación, produciéndose el aborto dentro de los 4 o 5 días siguientes.

ESTRUMATE es efectivo hasta los 150 días de gestación.

Cerdas: 0.7 ml/cerda. La inducción al parto deberá realizarse dentro de las 24 a 48 horas antes de la fecha prevista del mismo o a los 113 días después de la monta o IA, para disminuir el riesgo de mortalidad en los lechones. El parto suele producirse a las 19-29 horas de su administración.

Yeguas: 1 a 2 ml/yegua; y 0.50 a 1 ml/pony. En dosis única.

PRECAUCIONES: No se deben sacrificar animales para el consumo humano dentro de las 24 horas de administrar el producto. No es necesario desechar la leche de animales tratados.

PRESENTACIÓN:

Frasco x 20 ml.

REGISTRO: 9B1-3-2968-AGROCALIDAD.

ELABORADO POR: ESSEX ALEMANIA.

DISTRIBUIDO POR: IMPVET CÍA. LTDA.

Km 5,5 VÍA DAULE

Telf.: (04) 602-0410 / 09-9975-9666