

FARBIOBOLDEN



Anabólico
Solución inyectable



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Boldenona Undecilenato 5,0 g
Vehículo c.s.p 100 ml

INDICACIONES: Esteroide anabólico de acción prolongada, utilizando en la consecución de aumento de peso corporal, mediante aumento de la eficacia en la conversión de alimentos, a la vez que existe un mayor desarrollo de la estructura ósea.

DOSIS DE FARBIOBOLDEN:

ESPECIE	DOSIS	DURACIÓN
BOVINOS, EQUINOS Y PORCINOS	1 ml/90 kg peso	cada 28 días
OVINOS Y CAPRINOS	0,5 ml/45 kg peso	cada 28 días
CANINOS	0,5 ml/10 kg peso	cada 2-4 semanas
Dosis mayores de 10 ml se recomienda aplicarla en 2 puntos.		

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular profunda.

CONTRAINDICACIONES: No administrar en animales en mal estado general, en estados febriles, ni en situaciones de estrés intenso. No aplicar en animales en gestación. No debe ser utilizado repetidas veces ni sobre dosificar a hembras destinadas para la reproducción y/o empleadas como ganadería de cría, pues puede producir efectos masculinizantes y aumento del líbido, alterando el ciclo estral y la función ovárica.

La boldenona no se debe administrar a caballos destinados al consumo humano.

ADVERTENCIAS: No usar frecuentemente en animales jóvenes. El uso excesivo puede provocar efectos virilizantes no deseados y agresividad. Puede aparecer una ligera tumefacción en el sitio de aplicación, la cual desaparece a los pocos días sin necesidad de tratamiento. No se recomienda en otras especies que no sea la autorizada.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA: El empleo de boldenona durante la gestación está contraindicado porque pueden producir masculinización del feto.

REACCIONES ADVERSAS: Androgénicas (agresividad). La boldenona causa efectos perjudiciales en el tamaño de los testículos, y producción/calidad de espermatozoides en sementales. En yeguas puede causar reducción del número de folículos totales y grandes, ovarios más pequeños, aumento del tamaño del clítoris, menor duración del estro, tasas de gestación reducida y alteraciones importantes en la conducta sexual.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: Los anabólicos, en general, pueden potenciar los efectos de los anticoagulantes (ejemplo. Warfarina); se recomienda determinar el tiempo de protrombina y hacer los ajustes de dosis necesaria.

Los pacientes diabéticos que estén recibiendo insulina pueden necesitar ajustar la dosis si se agrega o se suspende la administración de anabólicos; estos últimos pueden disminuir la glucemia y los requerimientos de insulina.

TIEMPO DE RETIRO: 71 días.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

Frasco x 10 ml.
Frasco x 100 ml.
Frasco x 250 ml.

REGISTRO: 9B1-2-10812-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha
Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag
Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021
SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246
www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador