

FARBIODERM



**Antiinflamatorio - Antifúngico -
Antibacteriano - Antipruriginoso**
Crema tópica



COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene:

Clotrimazol.....	1,00 g
Bifonazol.....	0,50 g
Gentamicina	100 mg
Betametasona dipropionato.....	64 mg
Excipientes c.s.p.....	100 g

INDICACIONES: Es una crema bactericida, fungicida, antiinflamatoria y antiprurítica en las afecciones de la piel causadas por hongos, y bacterias sensibles a los componentes de la fórmula. Está indicada para el tratamiento de manifestaciones inflamatorias de las dermatosis que responden a la corticoterapia complicadas con infecciones secundarias causadas por la mayoría de aerobios Gram negativos, infecciones por enterobacterias, pseudomonas y hongos.

DOSIS: Una capa delgada de crema debe ser aplicada para cubrir completamente el área afectada y los alrededores, dos veces al día, en la mañana y en la noche. Para que el tratamiento sea efectivo debe aplicarse la crema regularmente. La duración del tratamiento varía dependiendo de la extensión, localización y la respuesta del paciente.

DOSIFICACIÓN DE FARBIODERM:

CONEJOS AVES BOVINOS EQUINOS	Una capa delgada de crema debe ser aplicada para cubrir completamente el área afectada y los alrededores, dos veces al día, en la mañana y en la noche.	OVINOS PORCINOS CANINOS FELINOS
	Para que el tratamiento sea efectivo debe aplicarse la crema regularmente. La duración del tratamiento varía dependiendo de la extensión, localización y la respuesta del paciente.	
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica.		

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica.

CONTRAINDICACIONES: Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a sus componentes.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA:

La Gentamicina en pequeñas cantidades pueden excretarse en la leche, el riesgo para las crías lactantes parece ser mínimo.

La Betametasona usar con cautela en las hembras en lactación, además, en machos reduce la producción de esperma y el volumen de semen.

REACCIONES ADVERSAS: El uso prolongado de Betametasona puede causar pelaje seco y opaco, aumento de peso, jadeo, vómitos, diarrea, incremento de las enzimas hepáticas, pancreatitis, ulceraciones gastrointestinales, lipidemia.

El clotrimazol puede ocasionar irritación local, ardor, eritema, edema, vesicación, descamación y prurito, a veces causa anorexia, ginecomastia e impotencia.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN:

El Ketoconazol reduce la depuración de los corticoides

TIEMPO DE RETIRO: Ninguno.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN:

Tubo x 30 g

REGISTRO: 2C2-12510-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador