

FARBIOMANGAN



Reconstituyente
Solución inyectable



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Yodo Metálico	0,300 g
Yoduro de Potasio	0,785 g
Yoduro de Sodio	0,785 g
Cloruro de Manganeso	0,278 g
Cloruro de Cobalto	0,255 g
Cloruro de Cerio	0,255 g
Cloruro de Sodio	0,215 g
Vehículo c.s.p	100 ml

INDICACIONES: Está recomendado en: Celos desordenados, trastornos en los ovarios, es coadyuvante en el tratamiento de infecciones, en deficiencias importantes de manganeso, yodo, cerio, cobalto. Como coadyuvante en el tratamiento de panadizo, es estimulante del sistema inmunológico.

DOSIS:

Bovinos y equinos: 20-40 ml.

Terneros y potros: 5-10 ml.

Porcinos: 10 ml.

Lechones: 3-5-8 ml.

Caninos y felinos: 0.5-2 ml.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular e Intravenosa.

CONTRAINDICACIONES: En animales con bronquitis aguda, hipertiroidismo latente. No es recomendado en animales debilitados ni en animales geriátricos.

ADVERTENCIAS: No administrar conjuntamente con diuréticos ahorradores de potasio.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA: Los yoduros pueden causar aborto en los bovinos, recomendando no usar en animales preñados. Evaluar el beneficio frente al riesgo de aplicarlo.

Los yoduros son excretados en la leche. Si se necesita administración de yoduros en madres en lactación, se debe considerar el uso de un sustituto lácteo.

REACCIONES ADVERSAS: En rumiantes, el perfil de efectos adversos se relaciona con excesivo yodo. Los animales jóvenes pueden ser más susceptibles al yodismo que los adultos. Los potrillos desarrollan bocio cuando las yeguas recibieron excesivo suplemento.

El uso crónico o la sobredosis pueden causar yodismo. Parecería que los gatos están más predispuestos al desarrollo de yodismo que otras especies. Los signos pueden incluir vómitos, inapetencia, depresión, calambres, hipotermia e insuficiencia cardiovascular.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: Los yoduros pueden disminuir la eficacia de los medicamentos antitiroideos.

TIEMPO DE RETIRO: Ninguno.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

Frasco x 20 ml.

Frasco x 50 ml.

Frasco x 100 ml.

Frasco x 500 ml.

REGISTRO: 9B3-1-10017-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador