

## FARBIOME C 4%



**Antiparasitario interno y externo-anabólico**  
Solución inyectable



**COMPOSICIÓN:** Cada ml contiene:

Ivermectina.....	40 mg
Boldenona.....	20 mg
Vitamina A.....	250.000 UI
Vitamina D <sub>3</sub> .....	37.250 UI
Vitamina E.....	25 UI
Vehículo c.s.p.....	1 ml

**INDICACIONES:** Antiparasitario de amplio espectro para el control de endoparásitos gastrointestinales, pulmonares redondos, larvas y el control de ectoparásitos como piojos, ácaros, gusano de monte o nuche en el ganado bovino, antiparasitario de larga acción. En casos de deficiencia de vitaminas AD<sub>3</sub>E, para prevenir y tratar desórdenes de orden reproductivo, para regenerar alteraciones de piel y mucosas, crecimiento retardado y para aumentar las defensas.

La boldenona actúa captando todo el nitrógeno biodisponible para convertirlo en proteína.

**Parásitos gastrointestinales:** *Haemonchus* sp., *Ostertagia ostertagi*, *Ostertagia lyrata*, *Trichostrongylus* sp., *Cooperia oncophora*, *Cooperia punctata*, *Cooperia pectinata*, *Oesophagostomum radiatum*, *Strongyloides papillosus*, *Nematodirus helvetianus*, *Nematodirus spathiger*, *Toxocara vitulorum* y *Trichuris* spp.

**Parásitos pulmonares:** *Dictiocaulus viviparus*, *Dictiocaulus filaria*.

**Ectoparásitos:** *Sarcoptes* sp., *Haematopinus* sp., *Dermatobia hominis*, *Boophilus microplus*, *Cochliomya hominivorax*, *Linognathus vituli*, *Psoroptes* spp. También está indicado como auxiliar en el control de la población de la mosca de los cuernos (*Haematobia irritans*).

**DOSIS:** 1 ml por cada 50 kg de peso vivo. Repetir la dosis cada 90 a 120 días si es necesario.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Intramuscular.

**CONTRAINDICACIONES:** No se recomienda usar el producto en animales muy jóvenes por contener el producto boldenona. No administrar en casos de hiperparatiroidismo ya que la fórmula contiene vitaminas liposolubles.

**ADVERTENCIAS:** Limpiar la zona de inyección antes de su administración.

En caso de reacciones alérgicas o shock anafiláctico tratar con epinefrina o antihistamínicos.

No usar en animales gestantes.

No usar más de 10 ml.

Los seres vivos cuyo hábitat es el medio acuático, son especialmente sensibles a la acción de la ivermectina, por lo tanto no arrojar los envases vacíos en ríos, estanques, bordos u otros cuerpos de agua ya que las Ivermectinas pueden alterar el ecosistema.

El producto por contener en su fórmula Boldenona puede causar efectos de reducción en el tamaño de los testículos, y producción/calidad de espermatozoides en sementales.

**USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA:** No aplicar en vacas gestantes, ya que al contener boldenona en la fórmula pueden producir masculinización del feto.

**REACCIONES ADVERSAS:** Cuando se usa para el tratamiento de la larva de *Hypoderma bovis* (cresa del bovino) en el ganado, la ivermectina puede inducir importantes efectos adversos al matar a las larvas cuando éstas se encuentran en áreas vitales. Las larvas muertas presentes en el canal vertebral pueden causar parálisis y

tambaleo. Las larvas muertas en el esófago pueden inducir salivación y timpanismo. Estos efectos pueden ser evitados tratando las cresas inmediatamente después de la estación de la mosca o durante el estadio de desarrollo de la cresa cuando se encuentra en las áreas mencionadas. En bovinos puede experimentar molestia o tumefacción transitoria en el sitio de inyección. Usando un máximo de 10 ml en cualquier sitio de inyección, se puede ayudar a minimizar estos efectos.

La boldenona puede causar retención de nitrógeno, sodio, potasio y fósforo y reducir la excreción urinaria de calcio.

**INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN:** La ivermectina se puede combinar con febantel, fenbendazol, prazicuantel, pirantel, albendazol entre otros para aumentar su espectro.

Los anabólicos pueden potenciar los efectos del anticoagulante.

**TIEMPO DE RETIRO:** Carne/leche: 4 meses.

**ALMACENAMIENTO:** Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

**DECLARACIÓN DE VENTA:** Con prescripción Médico Veterinaria.

**PRESENTACIONES:**

Frasco x 10 ml.

Frasco x 20 ml.

Frasco x 50 ml.

Frasco x 100 ml.

Frasco x 250 ml.

Frasco x 500 ml.

**REGISTRO:** 3A1-3B3-10198-AGROCALIDAD

**ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR:** FARBIOPHARMA S.A.

**Dirección:** Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador