

FEBENDAFAR 20 %®



Antiparasitario interno

Vía oral



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Febendazolo 20 g
Excipientes c.s.p. 100 ml

INDICACIONES: Recomendado para el tratamiento de parasitosis en:

Bovinos, ovinos, caprinos: *Haemonchus* sp., *Ostertagia* sp., *Cooperia* sp., *Oesophagostomum* sp., *Chabertia* sp., *Bunostomum* sp., *Trichuris* sp., *Neoascaris vitulorum*, *Capillaria* sp., *Strongyloides* sp., *Dictyocaulus* sp., *Trichostrongylus* sp., *Moniezia* sp.

Porcinos: *Oesophagostomum* sp., *Trichuris* sp.

Equinos: *Strongyloides* sp., *Neoascaris* sp., *Paracaris ecurom*, *Trichostrongylus axei*, *Oxyurus* sp.

DOSIS: La dosis recomendada es:

ESPECIES	DOSIS	
BOVINOS	5-7.5 mg/kg	2.5-3.75 ml/100 kg
OVINOS-CAPRINOS	5 mg/kg	1 ml/40 kg
EQUINOS	7.5 mg/kg	15 ml/400 kg
PORCINOS	5 mg/kg	1 ml/50 kg

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

PRECAUCIONES:

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Manténgase en un lugar fresco y protegido de la luz entre 8° y 25° C.
- Humedad relativa: 40-70 %.
- No hay tiempo de retiro en leche para animales tratados con el producto.
- Animales tratados con el producto no deben ser sacrificados para consumo humano hasta después de 15 días de la aplicación del producto.
- No administrar en animales menores de 100 kg de peso vivo.

PRESENTACIONES:

Cojín x 30 ml.
Jeringa x 5 ml.
Jeringa x 10 ml.
Jeringa x 15 ml.
Jeringa x 20 ml.
Frasco x 50 ml.
Frasco x 100 ml.
Frasco x 250 ml.
Frasco x 500 ml.
Frasco x 1 litro.
Galón.
Caneca

REGISTRO: 3A1-13955-AGROCALIDAD.

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: INDUFAR ECUADOR