

FENDEK



Antiparasitario interno
Suspensión oral



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Fenbendazol 10,0 g
Vehículo c.s.p 100 ml

INDICACIONES: Antiparasitario interno de amplio espectro, adulticida, larvicida y ovicida. Indicado para el tratamiento y la prevención de parasitosis gastrointestinales y pulmonares.

En caninos elimina áscaris (*Toxocara canis*, *T. leonina*), *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, parásito látigo (*Trichuris vulpis*) y parásitos chatos o tenias (*Taenia pisiformis*), infecciones por *Capillaria aerophila*, *Filaroides hirthei* y *Paragonimus kellicotti* en perros. No es efectivo contra *Dipylidium caninum*.

En bovinos y ovinos elimina formas adultas de *Haemonchus contortus*, *Ostertagia ostertagi*, *Trichostrongylus axei*, *Bunostomum phlebotomum*, *Nematodirus helvetianus*, *Cooperia* spp.; *Trichostrongylus colubriformis*, *Oesophagostomum radiatum* y *Dictyocaulus viviparus*. Es efectivo en los estados inmaduros de los parásitos citados, tiene buena actividad contra *Moniezia* spp. y detiene el proceso de las larvas de 4º estadio de *Ostertagia ostertagi*.

En equinos elimina grandes estróngilos (*S. edentatus*, *S. equinus*, *S. vulgaris*), pequeños estróngilos (*Cyathostomum* spp., *Cylicocyclus* spp.; *Triodontophorus* spp.) y oxiuros (*Oxyuris equi*).

En porcinos elimina parásitos redondos grandes (*Ascaris suum*), parásitos pulmonares (*Metastrongylus pairi*), parásitos nodulares (*Oesophagostomum dentatum*, *O. quadrispinolatum*), pequeños parásitos gástricos (*Hyostrongylus rubidus*), parásitos látigo (*Trichuris suis*) y parásitos renales (*Stephanurus dentatus*, tanto formas maduras como inmaduras).

Gatos elimina (Ascariasis, estrogiloides. *Taenia pisiformis*. *Ancylostoma* spp. *Uncinaria stenocephala*, *Aelurostrongylus abstrusus*, *Capillaria aerophila*, *Paragonimus kellicotti*, *Capillaria feliscati*, Giardiasis).

DOSIS DE FENDEK:

ESPECIE	DOSIS	DURACIÓN
BOVINOS	7,5 ml/100 kg p.v; (<i>Ostertagia</i> sp.): 10 ml/100 kg p.v	1 dosis cada 24 h durante 3 días
EQUINOS	10 ml/100 kg p.v	1 dosis cada 24 h durante 5 días
OVINOS, CAPRINOS Y PORCINOS	0,5 ml/10 kg p.v; (<i>Moniezia</i> sp.): 1 ml por 10 kg p.v	1 dosis cada 24 h durante 3 días
FELINOS	0,5 ml/ kg p.v	1 dosis cada 24 h de 3 a 10 días
CANINOS	0,5 ml/ kg p.v	1 dosis cada 24 h durante 3 días

El cuadro de dosis y duración pueden ser modificados por el Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

CONTRAINDICACIONES: No administrarse a equinos destinados al consumo humano.

ADVERTENCIAS: No se recomienda en otras especies que no sea la autorizada. Use guantes, especialmente cuando va a tratar a un grupo de animales.

No usar el producto en equinos destinados a propósitos alimen-

ticios.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA: El uso de fenbendazol se considera seguro en las perras preñadas y suele considerarse carente de riesgos durante la gestación en todas las especies.

REACCIONES ADVERSAS: En dosis individuales, el fenbendazol no suele causar ningún efecto adverso. Puede manifestarse reacciones de hipersensibilidad secundarias a la liberación de antígenos por parte de los parásitos muertos, en particular cuando se usan en dosis altas. Con frecuencia se pueden observar vómitos en los perros y gatos que reciben fenbendazol. Las monodosis (aún exageradas) no son efectivas en perros y gatos; el tratamiento debe durar 3 días.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: El oxfendazol o el fenbendazol no deben ser dados en forma concurrente con bromsalan; se han documentado abortos en bovinos y muertes en ovinos después de usar estos compuestos juntos.

TIEMPO DE RETIRO: Carne 8 días. No requiere tiempo de retiro en Leche.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

Cojín x 13 ml.
Jeringa x 30 ml.
Frasco x 100 ml.
Frasco x 250 ml.
Frasco x 500 ml.
Frasco x 1 000 ml.

REGISTRO: 3 A1-11784-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador