

FLORFENICOL FARBIOVET



Antibiótico
Polvo



COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene:

Florfenicol	95 g
Vehículo c.s.p	100 g

INDICACIONES: Está indicado al tratamiento y control de infecciones respiratorias y digestivas en aves y cerdos, producidas por microorganismos Gram positivos, Gram negativos y algunos anaerobios.

Gram Positivas: *Corynebacterium pyogenes*, *Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp., *Clostridium* spp.

Gram Negativas: *E. coli*, *Pasteurella haemolytica*, *P. multocida*, *Haemophilus somnus*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*.

Dentro de su espectro se incluyen también: *Proteus mirabilis*, especies de *Proteus indol* positivas, *Shigella* sp., *Salmonella* sp., enterococos, *Citrobacter* y *Haemophilus* sp.

DOSIS DE FLORFENICOL FARBIOVET:

Aves: Dosis de referencia 1 000 aves (20 mg Florfenicol/kg peso vivo)

FLORFENICOL FARBIOVET	Alimento	Agua de bebida (litros)	Edad semanas	Peso promedio
3,470 g	49,1 kg	56	0 a 1	165 g
8,420 g	69,1 kg	125	1 a 2	400 g
18,90 g	89,1 kg	174	2 a 3	900 g
29,27 g	111,4 kg	226	3 a 4	1.400 g
42,11 g	119,1 kg	264	4 a más	2.000 g

Porcinos: Dosis de referencia 100 cerdos (20 mg Florfenicol/ kg p.v)

FLORFENICOL FARBIOVET	Alimento	Agua de bebida (litros)	Edad semanas	Peso promedio
2-24 g	22,72 kg	300	0 a 6	0,91-11,36 kg
24-53 g	68,18-90,90 kg	500	7 a 11	11,36-25,00 kg
53- 120 g	136,36-227,27 kg	900	11 a 18	25,00-56,82 kg
120-191 g	227,27-272,72 kg	1 200	18 a más	56,82-90,91 kg

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. Para añadir al agua de bebida.

PREPARACIÓN: FLORFENICOL FARBIOVET es una solución que se mezcla directamente en el agua de bebida o en el alimento. En el caso de aplicarse en el agua de bebida, se sugiere hacer restricciones de agua y administrar el fármaco en forma de pulsos para que la dosis sea consumida totalmente.

CONTRAINDICACIONES: No usar el producto en casos conocidos de sensibilidad al Florfenicol.

ADVERTENCIAS: Utilizar soluciones o alimentos frescos y desechar los sobrantes. Dosificar de acuerdo a las instrucciones para evitar concentraciones subterapéuticas.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA: No administrar en aves de postura.

REACCIONES ADVERSAS: No se tiene registros acerca de que el Florfenicol tenga algún potencial tóxico, excepto un cierto grado

de inmunodepresión. No se aconseja que se aplique vacunas junto con este fármaco, aunque la evidencia al respecto es escasa. No es teratogénico ni citotóxico el Florfenicol a las dosis recomendadas. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha declarado que el Florfenicol no tiene riesgo de inducir anemia aplásica, sin embargo, tanto aves como en humanos con dosis muy elevadas y durante un tiempo mayor al recomendado se ha encontrado disminuido reversible del número de eritrocitos.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: Debe evitarse la mezcla con otros antibióticos del grupo de los Fenicoles como el Cloranfenicol o Tiamfenicol, ya que compiten por el mismo sitio de acción.

TIEMPO DE RETIRO: Aves de engorde 5 días.
Cerdos 15 días.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Venta Bajo Receta Médica.

PRESENTACIONES:

Sobre x 1 kg
Tambor x 25 kg

REGISTRO: 2C1-13232-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador