

FLORFLOX 15%



Antibiótico de amplio espectro y analgésico
Solución oral



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Florfenicol	15 g
Paracetamol	5 g
Vehículo c.s.p	100 ml

INDICACIONES: Está indicado en el tratamiento y control de infecciones respiratorias y digestivas en aves, producidas por microorganismos Gram positivos, Gram negativos y de algunos anaeróbios. Además presenta acción analgésica y antipirética gracias a la presencia del paracetamol.

DOSIS DE FLORFLOX 15%:

Uso del Gotero		
0,13 ml/ kg peso vivo 1 ml = 16 gotas.		
1 gota	pollo 0,5 kg p.v	
2 gotas	pollos 1 kg p.v	
4 gotas	pollos 2 kg p.v	
1 ml FLORFLOX 15% (150 mg florfenicol) en 2 litros de agua de bebida. Dosis (1.000 aves)		
FLORFLOX 15%	Edades (semanas)	Peso Promedio
28 ml/56 l agua	0 a 1	165 g
62,5 ml/125 l agua	1 a 2	400 g
87 ml /174 l agua	2 a 3	900 g
113 ml/226 l agua	3 a 4	1.400 g
132 ml /264 l agua	4 a más	2.000 g
Administrar de 3 - 5 días o según el Criterio del Médico Veterinario.		
20 mg de Florfenicol por cada kg de p.v.		

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

PREPARACIÓN: **FLORFLOX 15%** es una solución que se mezcla directamente en el agua de bebida de las aves, o se aplica directamente vía oral. En el caso de aplicarse en el agua de bebida, se sugiere hacer restricciones de agua y administrar el fármaco en forma de pulsos para que la dosis sea consumida totalmente.

CONTRAINDICACIONES: No usar el producto en casos conocidos de sensibilidad al Florfenicol o al paracetamol.

ADVERTENCIAS: Utilizar soluciones frescas y desechar los sobrantes. Dosificar de acuerdo a las instrucciones para evitar concentraciones subterapéuticas. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA: No administrar en aves de postura.

REACCIONES ADVERSAS: No se tiene registros acerca de que el Florfenicol tenga algún potencial tóxico, excepto un cierto grado de inmunodepresión.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: Debe evitarse la mezcla con otros antibióticos del grupo de los Fenicoles como el Cloranfenicol o Tiamfenicol, ya que compiten por el mismo sitio de acción.

SOBREDOSIFICACIÓN: No se ha observado síntomas clínicos en aves a dosis 4 veces superiores a la recomendada.

TIEMPO DE RETIRO: Carne 5 días.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Venta Bajo Receta Médica.

PRESENTACIONES:

Gotero x 10 ml (caja x 26)
Gotero x 20 ml (caja x 24)
Gotero x 50 ml
Frasco x 100 ml
Frasco x 1 litro
Galón x 3.8 l
Caneca x 20 l

REGISTRO: 2C1-3-12024-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha
Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag
Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021
SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246
www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador