

FLUNIX



Antiinflamatorio, analgésico y antipirético no esteroideal
Solución inyectable



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Flunixin Meglumine..... 5 g
Vehículo c.s.p 100 ml

INDICACIONES: FLUNIX está indicado como antiinflamatorio, analgésico, antipirético no esteroideal, para todo tipo de dolores musculares y articulares. Además, se lo utiliza para analgesia post-quirúrgica y traumatismos, así como coadyuvante en el tratamiento de mastitis. En equinos, para el tratamiento de cólicos.

DOSIS DE FLUNIX:

ESPECIE	USO	DOSIS
CANINOS	Como antiinflamatorio y analgésico, antipirético, obstrucción gastrointestinal.	IM, IV, SC: 0,25-0,5 ml/25 kg p.v/día, no más de 3 días.
BOVINOS	Como antiinflamatorio y analgésico.	IM o IV: 1-2 ml/45 kg p.v/12-24 horas
EQUINOS	Cólico/Tratamiento de dolor moderado a intenso.	IM o IV: 1 ml/45 kg p.v/día
PORCINOS	Analgésico.	IV, IM o SC: 1 ml/50 kg/8-12 horas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular, Intravenosa o Subcutánea.

CONTRAINDICACIONES: Pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, úlceras gástricas o enfermedades renales, hepáticas o hematológicas.

ADVERTENCIAS: Puede producir inflamación local, entumecimiento y sudación.

REACCIONES ADVERSAS: Cuando se usa para el dolor, si el animal no responde a la dosis inicial, es poco probable que las dosis adicionales sean efectivas y éstas pueden incrementar las posibilidades de toxicidad. En equinos, después de la inyección IM, se ha descrito la presentación de inflamación localizada, induración, rigidez y sudoración. El flunixin en equinos puede dar la posibilidad de intolerancia gastrointestinal, hipoproteinemia y anomalías hematológicas. Los equinos han desarrollado úlceras orales y gástricas, anorexia y depresión cuando la droga se administra en dosis altas durante periodo prolongados (>2 semanas). En equinos y bovinos, rara vez se ven reacciones de tipo anafiláctico, principalmente después de una administración IV rápida. Las inyecciones IM, en escasas ocasiones, pueden estar asociadas con mionecrosis clostridial.

La hematoquecia y la hematuria han sido descritas en bovinos tratados durante más de los 3 días recomendados.

En caninos el malestar gastrointestinal es la reacción adversa más probable. Los signos clínicos pueden ser vómito, diarrea y ulceración cuando se emplean dosis muy altas o por tiempo prolongado.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA:

El flunixin debe ser usado con cautela en animales en gestación, a pesar de que no existen informes acerca de su teratogenicidad o sus efectos sobre el rendimiento reproductivo o la duración de la gestación.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN:

Los AINE pueden aumentar los niveles en sangre de la ciclosporina y elevan el riesgo de nefrotoxicidad. Los AINE pueden reducir los efectos saluréticos y diuréticos de la furosemida.

TIEMPO DE RETIRO:

Bovinos: 7 días.

Porcinos: 21 días.

Leche: 24 horas.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

Frasco x 10 ml.

Frasco x 50 ml.

REGISTRO: 2C4-10961-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador