

FLUNIXIN CC



Antiinflamatorio, antipirético, analgésico
Solución inyectable



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Flunixin meglumine..... 8.3 g
Excipientes c.s.p..... 100 ml

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Antiinflamatorio, antipirético, analgésico.

FORMA FARMACÉUTICA: Solución inyectable.

INDICACIONES DE USO: FLUNIXIN CC es un producto no esteroide, con actividad analgésica, antipirética y antiinflamatoria, cuyo mecanismo de acción es el bloqueo de las prostaglandinas causantes del dolor, la fiebre y la inflamación a nivel de los aparatos vascular, respiratorio, gastrointestinal, reproductor y osteomuscular.

FLUNIXIN CC está indicado para equinos, bovinos y porcinos. Se recomienda en casos de dolor muscular, fiebre y/o inflamación. Muy efectivo para cólicos y cojeras en caballos, así como para el tratamiento del dolor agudo, causado por cirugías y heridas.

FLUNIXIN CC puede usarse para el tratamiento del Síndrome MMA (Mastitis – Metritis – Agalactia) de las cerdas.

DOSIS SUGERIDA: Se puede emplear la siguiente tabla de dosificación.

| ESPECIE | DOSIS TERAPÉUTICA DE PRINCIPIO ACTIVO | DOSIS TÉCNICA DE FLUNIXIN CC |
|----------|---------------------------------------|------------------------------|
| EQUINOS | 1.1-2.2 mg PA/kg | 1 ml/45 kg PV |
| BOVINOS | 2.2 mg PA/kg | 2 ml/45 kg PV |
| PORCINOS | 2.2 mg PA/kg | 2 ml/45 kg PV |

Repetir la dosis por 3 días seguidos, pero no más de 5 días consecutivos.

La frecuencia y duración del tratamiento podrá modificarse a indicación expresa del Médico Veterinario.

FORMA DE ADMINISTRACIÓN: Equinos: Intramuscular o intravenosa.

Bovinos: Intramuscular o intravenosa.

Porcinos: Intramuscular profunda.

USO VETERINARIO:

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

- Mantener el envase bien cerrado.
- Conservar a temperatura ambiente (15°C a 30°C) y 70% de HR.
- Proteger de la luz solar.

ADVERTENCIAS:

- No verter el producto en afluentes como ríos o arroyos.
- No reutilizar este envase.
- No administrar en hembras gestantes.
- No usar en caso de daño renal o hepático, ni en animales con lesiones de mucosa gastrointestinal
- Venta bajo receta médica.

MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

TIEMPO DE RETIRO:

Leche: 24 horas.

Carne: 7 días.

Porcinos: 7 días.

PRESENTACIONES:

Frasco x 10 ml.

Caja x 12 unidades.

Frasco x 50 ml.

Q.F.R.: Nelly López de Cobo

REGISTRO: 8A4-9651-AGROCALIDAD

REGISTRO PANAMÁ: RF-7877-16

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR: C.C. Laboratorios Pharmavital Cia Ltda, km. 7 ½ vía Quito, Ambato – Ecuador

Servicio al cliente: (593) 2 2806167 - (593) 2 2806436