

FLUNIXÍN



Antiinflamatorio, analgésico, antiespasmódico y antipirético
Vía intravenosa – intramuscular



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Flunixin Meglumine..... 8,3 g
 (Equivalente a 5g de Flunixin base)
 Excipientes c.s.p. 100 ml

GENERALIDADES: Fórmula no esterooidal de acción antiinflamatoria, analgésica y antipirética.

PROPIEDADES: Es un potente analgésico con propiedades antiinflamatorias, antiespasmódicas y antipiréticas, que bloquea la acción de las prostaglandinas causantes del dolor, fiebre e inflamación, actúa a nivel de los sistemas: vascular, respiratorio, nervioso, gastrointestinal, reproductor y ocular; su efecto es rápido y persistente. No posee los efectos colaterales de los corticoides.

INDICACIONES:

Equinos: Para tratamiento de inflamaciones en casos de laminitis, artritis, tendinitis, en alteraciones músculo esqueléticas, dolores viscerales y cólicos.

Bovinos: Coadyuvante en el tratamiento de metritis, mastitis, padadizo, heridas y cirugías, torceduras.

Porcinos: Coadyuvante del síndrome mastitis, metritis y agalactia.

Caninos: Disminuye la inflamación, dolor en cuadros agudos, coadyuvante en el tratamiento de parvovirus, neumonías, tendinitis, sinovitis.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Vía intravenosa – intramuscular.

DOSIS DE FLUNIXÍN:

ESPECIES	ml
EQUINOS	1,1 mg /1 kg de peso (1 ml/45 kg).
BOVINOS Y PORCINOS	2,2 mg /1 kg de peso (2 ml/45 kg).
CANINOS	1,1 mg/kg de peso (0,02ml/1kg).

(Máximo 3 días, 6 aplicaciones).

Repetir dosis a los 8 días o según criterio profesional.

TIEMPO DE RETIRO: No tiene.

PRECAUCIONES:

- Almacenar en sitio fresco, seco, protegido de la luz, a menos de 30 ° C y Humedad Relativa de 65 % ± 5 %.
- Una vez abierto el frasco, utilizar todo el contenido.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Elimine el envase luego de utilizar el producto.

PRESENTACIONES:

Frasco x 10 ml
 Frasco x 50 ml
 Frasco x 100 ml

REGISTRO: 8A4 – 11065-AGROCALIDAD.

FABRICADO Y COMERCIALIZADO POR: LAVETEC CÍA. LTDA.