

FLURADOG



Antiparasitario externo
Comprimidos saborizados



FÓRMULA: Cada comprimido contiene:

Fluralaner	112.5 mg
Excipientes c.s.p.	1 comprimido
Fluralaner	250.0 mg
Excipientes c.s.p.	1 comprimido
Fluralaner	500.0 mg
Excipientes c.s.p.	1 comprimido
Fluralaner	1000.0 mg
Excipientes c.s.p.	1 comprimido

ESPECIES: Caninos.

DOSIS DE FLURADOG:

DOSIS REFERENCIAL FLURALANER 25 mg/kg		
ESPECIE	PESO (kg)	DOSIS
CANINOS	2-4.5 kg	1 tableta (112.5 mg)
	>4.5-10 kg	1 tableta (250.0 mg)
	>10-20 kg	1 tableta (500.0 mg)
	>20-40 kg	1 tableta (1 000 mg)

INDICACIONES DE USO: Antiparasitario de amplio espectro externo que en un solo tratamiento elimina pulgas, garrapatas y ácaros; útil en tratamientos de demodicosis canina, observando resultados desde el primer tratamiento. Debido a su efecto sistémico y de larga acción se puede administrar a intervalos de 12 semanas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

FARMACOCINÉTICA: Después de la administración oral a perros, la vida media de eliminación se produce alrededor de 9-16 días. La biodisponibilidad del fluralaner después de la administración oral o tópica es aproximadamente del 25%; el administrar el comprimido o tableta juntamente con comida, aumenta la biodisponibilidad en 2 – 2.5 veces más.

Debido a que tiene un alto porcentaje de unión a proteínas plasmáticas, se asume que la principal ruta de eliminación es la hepática.

MECANISMO DE ACCIÓN: El fluralaner inhibe el ácido gamma aminobutírico (GABA) y los canales de cloruro activados por glutamato con una significativa selectividad para las neuronas de los insectos sobre las neuronas de los mamíferos. Dicha inhibición induce una actividad neuronal descontrolada, resultando en parálisis y la consecuente muerte de pulgas y garrapatas.

Después de la administración oral, la acción comienza a ser visible a las 8 horas para pulgas y a las 12 horas para garrapatas.

PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES:

- No se recomienda su uso en otra especie que no sea la autorizada.
- No administrar a pacientes con hipersensibilidad al activo.
- No utilizar en caninos con un peso menor a 2 kg o caninos menores de 6 meses de edad.
- Utilizar con precaución en pacientes con antecedentes de convulsiones o con anomalías neurológicas.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: No se han reportado.

REACCIONES ADVERSAS:

- La emesis es el efecto adverso más frecuente, aunque también podría observarse reducción del apetito, hipersalivación, letargia y diarrea.

- La hipersalivación se ha evidenciado en pacientes que recibieron productos de uso tópico por vía oral, a dosis altas.

RETIRO: No aplica.

PRESENTACIONES:

- Caja x 1 comprimido 112.5 mg
- Caja x 1 comprimido 250.0 mg
- Caja x 1 comprimido 500.0 mg
- Caja x 1 comprimido 1 000.0 mg

REGISTRO: RIP-FAR-101

ELABORADO POR: FARBIOPHARMA S.A. para INPEL QUALITY

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha
Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag
Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021
SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246
www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador