

FLUVIPEN



Antibiótico + Antiinflamatorio esteroideo
Polvo + diluyente



DESCRIPCIÓN: Asociación de antibióticos y corticoide.

COMPOSICIÓN: Una vez reconstituido cada 20 ml contiene:
 Penicilina G Procaínica 4 000 000 UI
 Dihidroestreptomicina..... 6 000 mg
 Flumetasona..... 1.3 mg
 Excipientes c.s.p..... 20 ml

INDICACIONES: Está indicado para el tratamiento de enfermedades causadas por bacterias susceptibles a las penicilinas y Dihidroestreptomicina, como, Mastitis, Metritis, Neumonías, Septicemias, Pododermatitis, Leptospirosis, tratamientos quirúrgicos post operatorios e involución uterina después del parto.

DOSIS:

Bovinos - Equinos: 1 ml por 20 kg de peso.

Porcinos - Ovinos: 1 ml por 15 kg de peso.

Caninos: 1 - 2 ml por 5 kg de peso.

Felinos: 0.5 - 1 ml por 5 kg de peso.

APLICACIÓN: Vía intramuscular profunda. Agregue el contenido del frasco diluyente al frasco que contiene el polvo y agite.
 Uso veterinario.

ADVERTENCIAS:

- No aplicar en hembras en gestación, puede ocasionar abortos.
- En caso de producirse reacciones alérgicas aplique epinefrina o antihistamínicos.
- Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.
- Tiempo de retiro: Carne 28 días y leche 3 días.
- Los envases eliminar en lugares autorizados.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Venta con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN:

Frasco x 20 ml + diluyente.

REGISTRO: Ecuador Reg. No. 2C1-3396-AGROCALIDAD

Panamá: RF-1289-10

Bolivia Reg. SENASAG PUV – F No. 005551/13

Guatemala MAGA No. EC432-07-01-3034

Perú Reg. SENASA No. F.06.01.I.046

Venezuela: M.I.6.384

ELABORADO POR: JAMES BROWN PHARMA

Av. Interoceánica (E28C) Km. 23.5, Sector El Rosal, Barrio La Libertad, Pífo. Quito – Ecuador - PBX: (593-2) 399-7000 - www.jamesbrownpharma.com