

FORTIPEN



Antibiótico + Antiinflamatorio no esteroideo
Polvo + diluyente



DESCRIPCIÓN: Asociación de antibióticos y un AINE.

COMPOSICIÓN: Cada ml contiene:

Penicilina G Procaínica	150 000 UI
Penicilina G Sódica	150 000 UI
Estreptomina	300 mg
Diclofenaco Sódico	15 mg
Excipientes c.s.p.	1 ml

INDICACIONES: Actúa contra bacterias Gram positivas y Gram negativas causantes de neumonías, septicemias, mastitis, panadizos, leptospirosis, actinomicosis, infecciones del ombligo, heridas quirúrgicas y accidentales en bovinos, equinos, porcinos y ovinos.

DOSIS:

1 ml por cada 20 kg de peso.

Equinos: 15 ml.

Bovinos: 20 ml.

Potros - Novillos: 10 ml.

Terneros, Porcinos, Ovejas: 3 - 8 ml.

Aplicar cada 12 horas por un máximo de 5 días o según criterio del Médico Veterinario.

APLICACIÓN: Vía intramuscular profunda, después de reconstituido.

Uso Veterinario.

ADVERTENCIAS:

- En caso de producirse reacciones alérgicas, aplicar Epinefrina o Antihistamínicos.
- Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.
- Eliminar los envases en un lugar autorizado.
- Tiempo de Retiro: Carne: 28 días Leche: 3 días.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Venta con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN:

Frasco x 20 ml con diluyente.

REGISTRO: Ecuador Reg. No. 2C4-8800-AGROCALIDAD

Panamá: RF-3830-07

Bolivia Reg. SENASAG PUV – F No. 005550/13

Guatemala MAGA No. 11-03-05-13,553

Perú Reg. SENASA No. F.03.13.I.1336

Venezuela: M.I.12.326

ELABORADO POR: JAMES BROWN PHARMA

Av. Interoceánica (E28C) Km. 23.5, Sector El Rosal, Barrio La Libertad, Pífo. Quito – Ecuador - PBX: (593-2) 399-7000 - www.jamesbrownpharma.com