FOSFOMICINA FARBIOVET

FARBIO PHARMA

Antibiótico de amplio espectro
Polvo oral

COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene:
Fosfomicina ..... 95 g
Excipientes c.s.p..... 100 g

INDICACIONES: FOSFOMICINA FARBIOVET es un antibiótico de amplio espectro indicado para el tratamiento de aves: Colibacilosis, septicemia, coriza infecciosa, síndrome de cabeza hínchada, onfalitis, cólera aviar, tifoidea aviar, artritis bacteriana y en cerdos: Colibacilosis, salmonelosis, complejo respiratorio porcino pleuroneumonía, artritis bacteriana, erisipela, infecciones intestinales, cistitis, pielonefritis, metritis.
Bacterias que ataca la Fosfomicina: *Staphylococcus aureus*; *Streptococcus* spp., *D. pneumoniae*; *N. meningitidis*; *Proteus mirabilis*; *E.coli*; *Serratia marcescens*; *Proteus mirabilis*; *E. coli*; *Serratia marcescens*; *Pseudomona aeruginosa*; *Haemophilus influenzae*; *Vibrion colerae*; *Peptococcus*; *Peotoestreptococcus*; *Fusobacterium*; *Proteus indoligenos*; *Klebsiela*; *Enterobacter*.

DOSIS: En aves y cerdos se recomienda una dosis de 10-40 mg de Fosfomicina por kilogramo de peso vivo durante 3 a 5 días.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

PREPARACIÓN: Con agua o alimento.

DOSIFICACIÓN (REFERENCIA 1 000 AVES)			
FOSFOMICINA FARBIOVET	**Alimento kg**	**Edades semanas**	**Peso promedio de las aves**
1,74	11,8	0 - 1	165 g
4,21 g	16,8	1 - 2	400 g
9,47 g	23,1	2 - 3	900 g
14,73 g	29,8	3 - 4	1.400 g
21,05 g	35,7	4 a más,	2.000 g

DOSIFICACIÓN (REFERENCIA 1 000 CERDOS)			
FOSFOMICINA FARBIOVET	**Alimento kg**	**Edades semanas**	**Peso promedio del Cerdo**
9,6 – 116 g	227,2	1 - 6	0,9 - 11 kg
116 - 263 g	681,8 – 909,0	6 - 11	11-25 kg
263 - 579 g	1.363,6 – 2.272,7	11 - 18	25-55 kg
579 - 947 g	2.272,7 – 2.727,2	18 - 28	55-90 kg

CONTRAINDICACIONES: Es un fármaco bien tolerado, aunque en su administración oral puede ocasionar náuseas, vómito y diarrea. En pacientes hipersensibles puede aparecer un rash cutáneo, que suele desaparecer con antihistamínicos, sin la interrupción del tratamiento.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA: Fosfomicina es un antibiótico que en principio no está contraindicado en la gestación. La FDA tiene incluida a la fosfomicina en la categoría B, respecto a efectos en la gestación; en la que por un lado se mencionan los fármacos que han sido probados en animales y no han producido malformaciones.

ADVERTENCIAS: No se recomienda en otra especie que no sea la autorizada. Una vez realizada la dilución en el agua de bebida, esta debe consumirse totalmente. No tiene resistencia cruzada con ningún otro antibiótico.

REACCIONES ADVERSAS: Una de las propiedades más notables de este antibiótico es la ausencia de toxicidad demostrada ampliamente en diferentes especies de animales. La toxicidad aguda estudiada en el ratón ha demostrado que las sales sódica y cálcica son esencialmente atóxicas, con DL_{50} oral de 5.5 g/ kg y 10g/ kg respectivamente.
La fosfomicina en general es un fármaco bien tolerado, aunque ocasionalmente puede producir algunos efectos adversos de escasa entidad.
Los más frecuentes son los gastrointestinales, sobre todo cuando se administra por vía oral, en forma de heces blandas, diarrea, náuseas y vómitos.
También se ha descrito hipersensibilidad en forma de anafilaxia. Las alteraciones hematológicas: Eosinofilia y trombocitosis, alteraciones de la función hepática de carácter leve, sobre todo de la transaminasa glutámico oxalacética (SGOT) y transaminasa glutámico piruvica (SGPT) y sobreinfecciones causadas por bacterias resistentes o levaduras.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: La fosfomicina asociado con aminoglucósidos, cloranfenicol, tetraciclinas, eritromicina presenta una acción sinérgica, con mayor absorción oral. Así también se ha demostrado su capacidad cito protectora ante el efecto de drogas antineoplásicas y antibióticos neurotóxicos, por lo ello la asociación con Cisplatino, aminoglucósidos, vancomicina, anfotericina B provee de una menor ototoxicidad y nefrotoxicidad de estos fármacos.
La administración simultánea de fosfomicina con cimetidina incrementa la tasa de absorción del antibiótico debido a la elevación de pH gástrico que produce cimetidina. Por el contrario, cuando se administra junto con metroclopramida disminuye la fracción absorbida de fosfomicina, probablemente por competición en el lugar donde se realiza la absorción.
Asociado a glucopéptidos no siempre presenta acción sinérgica.
No presenta resistencia cruzada con otros antibióticos. Y se ha observado bajísimos e invariables índices de resistencia en las últimas décadas, en medicina humana.

TIEMPO DE RETIRO: Carne: 48-60 horas. Huevos: 48-60 horas a partir de la ultima dosis.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15ºC y 30ºC. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Venta Bajo Receta Médica.

PRESENTACIÓN:
Sobre x 1 kg

REGISTRO: 2C1-13231-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.
Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha
Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag
Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021
SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246
www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador