

FUGOZOL



Antiparasitario interno de amplio espectro
Suspensión oral



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Albendazol micronizado	25,0 g
Sulfato de Zinc.....	2 g
Sulfato de Cobalto.....	3,2 g
Vehículo c.s.p.....	100 ml

INDICACIONES DE USO: Está indicado para el tratamiento y control de las parasitosis internas en bovinos y ovinos. Contra parásitos gastrointestinales y tenías, parásitos pulmonares y hepáticos (fasciola hepática).

En ganado (no lactante): *Ostertagia*, *Haemonchus* spp.; *Trichostrongylus* spp.; *Nematodirus* spp.; *Cooperia* spp.; *Bunostomum phlebotomum*, *Oesophagostomum* spp.; *Dictyocaulus viviparus* (adulto y L4), *Fasciola hepatica* (adultos) y *Moniezia* spp.

En ovejas: *Ostertagia circumcincta*, *Marshallagia marshalli*, *Haemonchus contortus*, *Trichostrongylus* spp.; *Nematodirus* spp.; *Cooperia* spp.; *Oesophagostomum* spp.; *Chabertia ovina*, *Dictyocaulus filaria*, *Fasciola hepatica*, *Fasciola magna*, *Moniezia expansa* y *Thysanosoma actinioides*.

DOSIS DE FUGOZOL:

Peso (kg)	Parásitos gastrointestinales, pulmonares y tenías (ml)	Fasciola Hepática (ml)
50	1	2
100	2	4
200	4	8
300	6	12
400	8	16
500	10	20

DOSIS: Bovinos, Ovinos.

En el control de parásitos gastrointestinales y pulmonares usar 5 mg/kg de peso o 2 ml por cada 100 kg de peso.

Para fasciola hepática duplicar la dosis (4 ml cada 100 kg de peso), dosis única.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

CONTRAINDICACIONES: No se debe utilizar en animales en período de gestación.

Dosificar de acuerdo a las instrucciones para evitar concentraciones subterapéuticas.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA:

El Albendazol administrado al comienzo de la gestación ha causado efectos teratogénicos y embriotóxicos en ratas, conejos y ovejas. No se debe utilizar en animales en período de gestación.

ADVERTENCIAS: El producto que viene en las presentaciones de frascos debe agitarse antes de usarse.

REACCIONES ADVERSAS: El Albendazol administrado en las dosis recomendadas en el ganado bovino es bien tolerado y no causa efectos adversos significativos.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN:

La cimetidina aumenta los niveles de Albendazol en bilis y los líquidos quísticos.

La dexametasona puede aumentar los niveles séricos de Albendazol.

Praziquantel puede aumentar los niveles séricos de Albendazol.

Comercialmente puede encontrarse en combinaciones con febantel, ivermectina, levamisol, Piperazina y Praziquantel, con los que aumenta su espectro.

TIEMPO DE RETIRO: Carne: 14 días antes del sacrificio.

Leche: 45 días. No administrar a vacas en los primeros 45 días de gestación o hasta 45 días después de haber retirado los carneros del servicio. En dosis prolongadas por varios días, puede provocar diarreas y deshidratación.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C a 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

Jeringa x 10 ml.
Jeringa x 20 ml.
Frasco x 100 ml.
Frasco x 250 ml.
Frasco x 500 ml.
Frasco x 1.000 ml.

REGISTRO: 3A1-2-3-8148-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador