

GENTAX



Antibiótico de amplio espectro
Solución Inyectable



COMPOSICIÓN: Cada ml contiene:

Gentamicina Sulfato 67,8 mg
Excipientes c.s.p 1 ml

DOSIFICACIÓN DE GENTAX:

DOSIS REFERENCIAL POR ESPECIE	DOSIS DEL PRODUCTO	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
6,6 mg/kg EQUINOS	5 ml/50 kg p.v./24 h	IV/IM
6 mg/kg CANINOS FELINOS	0.5 ml/5 kg p.v./24 h	IV/IM/SC
5 mg/kg PORCINOS	1 ml/10 kg p.v./24 h	IM
13.5 mg/kg TERNEROS	10 ml/50 kg p.v./24 h	IM/IV
5.5 mg/kg BOVINOS ADULTOS	20 ml/250 kg p.v./24 h	IM/IV

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO: Dependiendo de la especie animal y patología a tratarse se recomienda de 3-10 días consecutivos de tratamiento, salvo mejor criterio del Médico Veterinario.

ESPECIES: Equinos, Bovinos, Terneros, Porcinos, Caninos y Felinos.

INDICACIONES: GENTAX es un antibiótico bactericida de amplio espectro de la línea de los aminoglucósidos, efectivo en tratamientos de: colibacilosis, salmonelosis, septicemias, gastroenteritis bacterianas, infecciones genitourinarias, infecciones del tracto respiratorio, piel y tejidos blandos.

USOS DE LA GENTAMICINA:

Equinos: Artritis séptica (sepsis) por gramnegativos en potros, queratoconjuntivitis, infecciones provocadas por *Pseudomona aeruginosa* o *Klebsiella pneumoniae*, otitis no crónicas.

Yeguas: Infecciones genitourinarias.

Perros: Infecciones por enterobacterias y *Pseudomona* sp. Resistentes a otros antibióticos.

Gatos: Infecciones por enterobacterias y *Pseudomona* sp. Resistentes a otros antibióticos.

Cerdos: Lechones, enteritis por *E. coli*, Disentería porcina.

Bovinos: Septicemia coliforme, infecciones uterinas.

ADVERTENCIAS: Los aminoglucósidos causan nefrotoxicidad y ototoxicidad. La ototoxicidad (toxicidad a nivel del VIII par craneano) producida por los aminoglucósidos se puede manifestar por signos clínicos auditivos y/o vestibulares, y puede ser irreversible. Este antibiótico puede causar bloqueo neuromuscular, edema facial, dolor/inflamación en el sitio de la inyección, neuropatía periférica y reacciones de hipersensibilidad. Rara vez se desarrolla signos clínicos gastrointestinales, hematológicos y hepáticos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

PERIODO DE RETIRO

Bovinos:

Carne: 30 días.

Leche: 72 horas.

Porcinos:

Carne: 40 días

VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

Frasco x 10 ml

Frasco x 50 ml

Frasco x 100 ml

REGISTRO: 2C1-18404-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador