

GRISEO PET



Antimicótico
Comprimidos



COMPOSICIÓN: Cada 400 mg contiene:

Griseofulvina..... 100 mg
Excipientes c.s.p..... 400 mg

INDICACIONES: Es un antimicótico, obtenido del *Penicillium griseofulvum*, utilizado en medicina veterinaria, para tratar sistémicamente las dermatomicosis. Presenta una marcada acción, sobre los dermatofitos presentes en las lesiones superficiales, tales como *Microsporum canis*, *Microsporum gypseum* (tanto en lesiones alopecicas o nodulares). *Trychophyllum mentagrophytes*.

DOSIS:

Caninos: 1 comprimido por cada 4 kg de peso (dosis 25 mg/kg/día).

Felinos: 1 comprimido por cada 2 kg de peso (dosis 50 mg/kg/día).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. Se recomienda administrar la dosis acompañada de un alimento ligeramente rico en grasa, pues favorece su absorción a nivel intestinal.

CONTRAINDICACIONES: La Griseofulvina está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a la droga o con insuficiencia hepatocelular. No administrar a hembras gestantes por ser un medicamento teratogénicos.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA:

La griseofulvina es un conocido teratógeno en los gatos, y es probable que en los perros también lo sea. Las dosis de 35 mg/ kg dadas a gatos durante el primer tercio de la gestación causaron paladar hendido, y otras malformaciones esqueléticas y cerebrales en los gatitos. También pueden inhibir la espermatogénesis. Este medicamento debe considerarse como contraindicado durante la preñez. No se ha encontrado información con respecto a la seguridad de su uso durante la lactación.

ADVERTENCIAS: No se recomienda para el tratamiento de infecciones menores, que puedan ser autolimitantes, y que respondan a un tratamiento local por sus efectos tóxicos en gatos, debe reservarse contra infecciones graves en que no existe otra alternativa, debido a que su efecto es impredecible. Al parecer, los efectos tóxicos en gatos se deben a idiosincrasia, más que a la dosis.

Los gatos deben ser evaluados en busca del virus de la inmunodeficiencia felina antes de usar Griseofulvina, debido a los posibles efectos neutropénicos o panleucopénicos de la droga.

Sin embargo, los riesgos de producir efectos teratogénicos (espina bífida, cisura palatina, anoftalmia y otras) contraindica su empleo durante la gestación en todas las especies animales.

REACCIONES ADVERSAS: La griseofulvina puede causar anorexia, vómitos, diarrea, anemia, neutropenia, leucopenia, trombocitopenia, depresión, ataxia, hepatotoxicidad, dermatitis/fotosensibilidad y necrosis epidérmica tóxica en dosis superiores a 160 mg/ kg/día. La neutropenia y anemia se asocia al síndrome de inmunodeficiencia viral felina (SIVFE).

A excepción de los signos clínicos gastrointestinales los efectos adversos son poco frecuentes a las dosis usuales. Los gatos, en particular los gatitos, pueden ser más susceptibles a los efectos adversos (por ejemplo., mielosupresión) que otras especies.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: La griseofulvina puede disminuir los niveles de salicilatos (aspirina).

La griseofulvina puede disminuir los niveles de ciclosporina.

El fenobarbital y otros barbitúricos han sido implicados en la disminución de la concentración sanguínea de griseofulvina, presumiblemente por inducción de las enzimas microsomales hepáticas y/o reducción de la absorción. Si el fenobarbital y la griseofulvina deben administrarse en forma concurrente, habrá que hacer un ajuste de la dosis.

La teofilina en algunos pacientes, la griseofulvina puede disminuir la vida media de la teofilina y sus niveles.

La warfarina puede tener su actividad anticoagulante reducida por la griseofulvina; se puede requerir un ajuste del anticoagulante.

Al administrar con rifampicina se acelera su metabolismo, ya que hay inducción de enzimas hepáticas.

TIEMPO DE RETIRO: Ninguno.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN:

Caja x 12 comprimidos.

REGISTRO: 2C4-14052-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador